


## نبذة عن عالم



عرف القرن التاسع عشر اهتماما واسعا بالدقة الرياضية المؤدية إلى تحديد المفاهيم الأساسية للتحليل . و كان عالم الرياضيات و الفيزياء الفرنسي أوغستان لوي كوشي ( 1789 - 1857م ) *Augustin-Louis Cauchy* من بين رموز هذا التوجه . دخل كوشي مدرسة الهندسة ( مدرسة الجسور و الطرق ) وأشرف عليه بيير جيرارد *Pierre Girard* في مشروع قناة *Ourcq* ، وأسهم في انشاء ميناء بحري في شيربورغ عام 1810 . تميز كوشي بأعماله في الرياضيات ، وحل مجموعة مسائل تحد طرح عليه لاغرانج *Lagrange* ، وفي عام 1814 نشر بحثا عن التكمالات المحدودة ، وعين كوشي في هذا العام أستاذا مساعدا في التحليل في مدرسة البوليتكنيك . درّس طرق التكمال في كلية العلوم ، ووضع تعاريف دقيقة للنهايات والاتصال والتكمال ولتقارب المتتاليات والمتسلسلات . وساهم في تعريف الاتصال على مجال  $[a, b]$  .



جوزيف لوي لاغرانج



أوغستان لوي كوشي

 $f$  في متصلة  $a$  $f$  في متصلة غير  $a$ 

La notion de continuité nous est familière : le temps s'écoule d'une manière continue , on ne passe pas brutalement de 12h à 12h01s , il n'y pas de saut . C'est en ce sens que l'expression fonction continue est employée en mathématiques .

## بطاقة تقنية رقم : 02

<p>المستوى : الثانية باكوريا علوم تجريبية درس : النهايات و الاتصال التدبير الزمني : 15 ساعة</p>	<p>ثانوية : الفتح التأهيلية السنة الدراسية : 2015 - 2016 الأستاذ : عادل بناجي</p>
<p>1 مبرهنة القيم الوسطية</p> <p>2 الدالة العكسية لدالة متصلة</p> <p>3 دالة الجذر من الرتبة <math>n</math></p>	<p>4 الاتصال في نقطة - الاتصال على مجال</p> <p>5 العمليات على الدوال المتصلة</p> <p>6 صورة مجال بدالة متصلة</p> <p style="text-align: center;"><b>فقرات الدرس</b></p>
<p>• مفاهيم أساسية في درس النهايات و الاشتقاق</p>	<p>• عموميات حول الدوال العددية</p> <p>• دراسة الدوال العددية</p> <p style="text-align: center;"><b>المكتسبات القبلية</b></p>
<p>• تحديد صورة قطعة أو مجال بدالة متصلة و بدالة متصلة و رتيبة قطعاً ؛</p> <p>• تطبيق مبرهنة القيم الوسيطة في دراسة بعض المعادلات و المتراجحات أو دراسة إشارة بعض التعابير...؛</p> <p>• استعمال طريقة التفرع الثنائي (<i>ladichotomie</i>) في تحديد قيم مقربة لحلول المعادلة أو لتأطير هذه الحلول ؛</p> <p>• تطبيق مبرهنة القيم الوسيطة و مبرهنة الدالة التقابلية في حالة دالة متصلة و رتيبة قطعاً على مجال ؛</p>	<p style="text-align: center;"><b>الكفاءات المستهدفة</b></p>
<p>• يتم اعتماد التعريف التالي : نقول إن دالة <math>f</math> متصلة في النقطة <math>x_0</math> إذا كان <math>\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)</math> ؛</p> <p>• نقبل النتائج المتعلقة باتصال الدوال الحدودية والجذرية و الدوال المثلثية والدالة جذر مربع ويتم التركيز على تطبيقاتها ؛</p> <p>• نقبل أن صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة وأن صورة مجال بدالة متصلة هي مجال ثم نستنتج مبرهنة القيم الوسطية ؛</p> <p>• نقبل خاصيات العمليات على الدوال المتصلة و اتصال مركب دالتين .</p>	<p style="text-align: center;"><b>التوجيهات التربوية</b></p>
<p>سلسلة أنشطة - سلسلة تمارين - الكتاب المدرسي - ملخص المكتسبات السابقة ؛</p>	<p style="text-align: center;"><b>الوسائل اليداكتيكية</b></p>

## النهايات

### نشاط

...

#### 1 أحسب النهايات التالية

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3x^5 - 4}{27x^7 - x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 5x^3 - x^5 - 3}{3x^4 - 4x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x^3 + x}{x^3 - 7x^2 - 5x + 75}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{27x^7 - x^3 - 4x}{2x^2 + 6x + 4}$$

#### 2 أحسب النهايات التالية

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{20 - x^3}{11x - 2x^2 - 15}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2 + 4}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{x^2 + x - 4}{x^2 + 6x + 8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{-5x - 3}{-3x^2 + 11x - 6}$$

#### 3 أحسب النهايات التالية

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x^3 + x}{2x - x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{27 - x^3}{11x - 2x^2 - 15}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\sqrt{5}} \frac{x + \sqrt{5}}{5 - x^2}$$

#### 4 أحسب النهايات التالية

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 25} \frac{x - 25}{\sqrt{x} - 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4-x} - \sqrt{4+x}}{x}$$

#### 5 أحسب النهايات التالية

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{3x^2 - 4x + 7} - 3x + 8$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^2 - 1 - 12x + \sqrt{4x+7}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{7x-9} + 8x^5 - 4x^3 + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{x^2 - 6x - 2} - x + 12$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - \sqrt{8x-3} + 2x^4 - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{-9x-4} - 8x^2 - 3x - 1$$

### الأشكال غير المحددة

الأشكال غير المحددة هي :  $\frac{0}{0}$   $\frac{\infty}{\infty}$   $0 \times \infty$   $+\infty - \infty$

### خاصيات النهايات

#### خاصية

نهايات دوال اعتيادية في  $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{|x|} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

## خاصية

نهايات دوال اعتيادية في  $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{|x|}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

## خاصية

نهايات دوال اعتيادية في 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt{|x|}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

## خاصية

نهايات الدوال الجذرية والحدودية

**2** نهاية دالة جذرية عند  $+\infty$  أو  $-\infty$  هي نهاية خارج حديها الأكبر درجة

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

**1** نهاية دالة حدودية عند  $+\infty$  أو  $-\infty$  هي نهاية حدها الأكبر درجة

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

## خاصية

نهايات الدوال المثلثية

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$$

$$(a \neq 0); \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

## خاصية

النهايات و الترتيب

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l' \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

$$\begin{cases} 0 < f(x) \leq u(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

$$\begin{cases} u(x) \leq f(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

$$\begin{cases} g(x) \leq f(x) \leq h(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

$$\begin{cases} |f(x) - l| \leq u(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

$$\begin{cases} f(x) \leq u(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$



## 1 الارتصال في نقطة - الارتصال على مجال

### 1.1 الارتصال في نقطة

#### نشاط

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} & ; x \neq 2 \\ f(2) = 4 \end{cases}$$

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بمبايلي :


1 حدد  $D_f$  مجموعة تعريف الدالة  $f$

2 أحسب  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

3 أنشئ التمثيل المبياني للدالة  $f$

⚡ نلاحظ أن  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$  نقول إن الدالة  $f$  متصلة في 2

#### نشاط



لتكن  $f$  دالة عددية و  $C_f$  منحناها في معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  (أنظر الشكل جانبه ) .


1 من خلال الشكل كيف ترى المنحنى  $C_f$  عند النقطة ذات الأفصول -1 ثم عند النقطة ذات الأفصول 3

2 أ. أوجد مبيانيا  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$  و  $f(3)$  . ماذا تستنتج ؟


ب. أوجد مبيانيا  $f(-1)$  ونهاية  $f$  عند -1 . ماذا تستنتج ؟

## تعريف

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال مفتوح  $I$  و  $a$  عنصر من  $I$ ، تكون  $f$  متصلة في  $a$  إذا وفقط إذا كان :  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$



$f$  غير متصلة في  $a$



$f$  متصلة في  $a$

## مثال

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بمبايلي :  $\begin{cases} f(x) = \frac{2x^2 - 2}{x - 1} & ; x \neq 1 \\ f(2) = 4 \end{cases}$  لنبين أن  $f$  متصلة في 1 .

لدينا :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x^2 - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} 2(x - 1) \\ &= 4 = f(2) \end{aligned}$$

بما أن  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$  فإن  $f$  متصلة في 1 .

## ملاحظة

إذا كانت  $f$  غير متصلة في  $a$  فإننا نقول إن  $f$  غير متصلة (أو منقطعة) في  $a$  .

- ...
- 1 نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بمايلي :  $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-9}{x-3} & ; x \neq 3 \\ f(3) = 6 \end{cases}$  بين أن  $f$  متصلة في 3 .
- 2 نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بمايلي :  $\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} & ; x \neq 1 \\ f(1) = 3 \end{cases}$  هل  $f$  متصلة في 1 ؟

- نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بمايلي :  $\begin{cases} f(x) = \frac{x^3-8}{x-2} & ; x \neq 2 \\ f(2) = a \end{cases}$  حدد قيمة العدد الحقيقي  $a$  لكي تكون  $f$  متصلة في 2 .  $a \in \mathbb{R}$

## 2.1 الاتصال على اليمين - الاتصال على اليسار

### تعريف

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال من نوع  $[a, a+\alpha[$  حيث  $(\alpha > 0)$  تكون  $f$  متصلة على اليمين في  $a$  إذا وفقط إذا كان :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال من نوع  $]a-\alpha, a]$  حيث  $(\alpha > 0)$  تكون  $f$  متصلة على اليسار في  $a$  إذا وفقط إذا كان :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

### خاصية

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال مفتوح  $I$  و  $a$  عنصر من  $I$  ، تكون  $f$  متصلة في  $a$  إذا وفقط إذا كانت متصلة على اليمين ومتصلة على اليسار في  $a$  أي :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

## تطبيقي تمرين

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x+3} & ; x > 1 \\ f(x) = x+1 & ; x \leq 1 \end{cases}$$

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بمائلي :

- 1 أدرس اتصال  $f$  على اليمين وعلى اليسار في 1
- 2 هل الدالة  $f$  متصلة في 1 ؟

## تطبيقي تمرين

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} & ; x > 2 \\ f(x) = \frac{x^2-4x+3}{x-3} & ; x \leq 2 \end{cases}$$

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بمائلي :

- 1 أحسب  $f(2)$
- 2 أدرس اتصال  $f$  في 2

## 3.1 الاتصال على مجال

### تعريف

- تكون الدالة  $f$  متصلة على المجال المفتوح  $]a, b[$  إذا كانت متصلة في كل نقطة من المجال  $]a, b[$
- تكون الدالة  $f$  متصلة على المجال المغلق  $[a, b]$  إذا كانت متصلة على  $]a, b[$  ومتصلة في  $a^+$  و  $b^-$

### ملاحظات

- نعرف بالمثل الاتصال على المجالات  $[a, b]$  و  $]a, b]$  و  $[a, +\infty[$  و  $]-\infty, b]$
- التمثيل المبياني لدالة متصلة على  $[a, b]$  هو خط متصل طرفاه النقطتان  $(a, f(a))$  و  $(b, f(b))$



## مثال

دالة الجزء الصحيح

→ دالة الجزء الصحيح هي الدالة التي نرمز لها بـ  $E$  والتي تحقق : إذا كان  $E(x) = n$  (حيث  $n \in \mathbb{Z}$ )  
→ مثلا :

$$E(3,5) = 3 \text{ لأن } 3 \leq 3,5 < 3+1$$

$$E(5) = 5 \text{ لأن } 5 \leq 5 < 5+1$$

$$E(-2,4) = -3 \text{ لأن } -3 \leq -2,4 < -3+1$$

$$E(\sqrt{5}) = 2 \text{ لأن } 2 \leq \sqrt{5} < 3 \Rightarrow \sqrt{4} \leq \sqrt{5} < \sqrt{9} \Rightarrow 4 \leq 5 < 9$$

1 مثل مبيانيا الدالة  $E$  على المجال  $[0,4[$

2 أدرس اتصال الدالة  $E$  على المجالات  $[0,1[$  ،  $[0,2[$  ،  $]1,2[$  ،  $]1,3[$  و  $[3,3,5]$

## خاصية

...

- كل دالة حدودية متصلة على  $\mathbb{R}$
- كل دالة جذرية متصلة على مجموعة تعريفها
- الدالتين  $x \mapsto \sin(x)$  و  $x \mapsto \cos(x)$  متصلتين على  $\mathbb{R}$
- الدالة  $x \mapsto \tan(x)$  متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها
- الدالة  $x \mapsto \sqrt{x}$  متصلة على  $\mathbb{R}^+$

## أمثلة

...

- الدالة  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x + 7$  متصلة على  $\mathbb{R}$  (لأنها دالة حدودية)
- الدالة  $f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}$  متصلة على  $\mathbb{R} - \{1\}$  (لأنها دالة جذرية)
- الدالة  $f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}$  متصلة بالخصوص على المجالين  $] -\infty, 1[$  و  $]3, +\infty[$  (لأنها  $\mathbb{R} - \{1\} \subset ] -\infty, 1[$  و  $]3, +\infty[ \subset \mathbb{R} - \{1\}$ )

## 4.1 قصور دالة عددية

### تعريف

إذا كانت  $f$  دالة معرفة على مجال  $I$  و  $g$  دالة معرفة على مجال  $J$  ضمن  $I$  بحيث  $\forall x \in I \ f(x) = g(x)$  ، فإننا نقول إن الدالة  $g$  قصور الدالة  $f$  على المجال  $J$  .

إذا كانت الدالة  $f$  متصلة على  $I$  و  $g$  قصور الدالة  $f$  على المجال  $I$  فإن  $g$  متصلة على  $I$

## 2 العمليات على الدوال المتصلة

### خاصية

#### خاصية مقبولة

لنكن  $f$  و  $g$  دالتين متصلتين على مجال  $I$  و  $k$  عددا حقيقيا .  
الدوال  $f+g$  و  $f-g$  و  $f \cdot g$  و  $(kf)$  و  $\frac{f}{g}$  و  $\frac{1}{g}$  متصلة على  $I$  .  
( $\forall x \in I, g(x) \neq 0$ )

### مثال

...

- 1 الدالة  $x \mapsto x^2 + \sqrt{x}$  متصلة على  $\mathbb{R}^+$  (لأنها مجموع الدالتين  $x \mapsto x^2$  و  $x \mapsto \sqrt{x}$  المتصلتين على  $\mathbb{R}^+$ )
- 2 الدالة  $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$  متصلة على  $]0, +\infty[$  (لأنها مقلوب الدالة  $x \mapsto \sqrt{x}$  المتصلة على  $]0, +\infty[$  ولا تنعدم على  $]0, +\infty[$ )
- 3 الدالة  $x \mapsto \frac{x+2}{\sqrt{x}+x^2}$  متصلة على  $]0, +\infty[$  (لأنها خارج الدالة  $x \mapsto x+2$  المتصلة على  $]0, +\infty[$  و الدالة  $x \mapsto \sqrt{x}+x^2$  المتصلة على  $]0, +\infty[$  ولا تنعدم على  $]0, +\infty[$ )

### تطبيقي تمرين

بين أن الدالة  $f$  متصلة على المجال  $I$  في كل حالة من الحالات التالية :

1  $I = ]0, +\infty[$  و  $f(x) = 2x + \sqrt{x}$

2  $I = \mathbb{R}$  و  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2}$

3  $I = ]0, +\infty[$  و  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x}}$

4  $I = [0, +\infty[$  و  $f(x) = \sin(x) + \sqrt{x}$

5  $I = \mathbb{R}$  و  $f(x) = \frac{\cos(x)}{x^2 + 1}$

## تمرين

لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  بمبايلي :  $1 \leq x \leq 3$  :  $f(x) = 2x - 3$  ; حدد العددين الحقيقيين  $a$  و  $b$  لكي تكون  $f$  دالة متصلة على  $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} f(x) = x + a & ; x < 1 \\ f(x) = 2x - 3 & ; 1 \leq x \leq 3 \\ f(x) = bx + 1 & ; x > 3 \end{cases}$$

## نشاط

نعتبر  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين المعرفتين ب :  $f(x) = x^2 + x + 1$  و  $g(x) = \sqrt{x}$

1 دد الدالة  $g \circ f$

2 ادرس اتصال  $f$  في 0 و اتصال  $g$  في  $f(0)$

3 ادرس اتصال الدالة  $g \circ f$  في 0

## خاصية

اتصال مركب دالتين

لتكن  $f$  دالة متصلة على  $I$  و  $g$  دالة متصلة على  $J$  و  $f(I) \subset J$  :  
الدالة :  $g \circ f$  متصلة على  $I$

## مثال

لندرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة ب :  $f(x) = \sin\left(\frac{3}{x}\right)$  على  $D_f$

• لدينا  $D_f = \mathbb{R}^*$

• نضع :  $f(x) = h(g(x))$  بحيث  $g(x) = \frac{3}{x}$  و  $h(x) = \sin(x)$

لدينا  $g$  دالة جذرية إذن فهي متصلة على مجموعة تعريفها  $\mathbb{R}^*$  ؛ و  $h$  دالة متصلة على  $\mathbb{R}$  وبالنحوص على  $\mathbb{R}^*$  وبالتالي فإن  $f$  متصلة على  $\mathbb{R}^*$  (لأنها مركب دالتين متصلتين على  $\mathbb{R}^*$ )

## تطبيقي تمرين

...

1 باستعمال مركب دالتين ادرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة بمبايلي :  $f(x) = \sin(x^3 - 3x + 2)$  على  $\mathbb{R}$

2 باستعمال مركب دالتين ادرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة بمبايلي :  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$  على  $[-1, 1]$

...

1 إذا كانت  $f$  دالة موجبة و متصلة على مجال  $I$  (أي  $\forall x \in I: f(x) \geq 0$ ) فإن الدالة  $x \mapsto \sqrt{f}$  متصلة على المجال  $I$

2 إذا كانت الدالة  $f$  متصلة على مجال  $I$  فإن الدالة  $x \mapsto \cos(f(x))$  متصلة على المجال  $I$

3 إذا كانت الدالة  $f$  متصلة على مجال  $I$  فإن الدالة  $x \mapsto \sin(f(x))$  متصلة على المجال  $I$

## تطبيقي تمرين

...

1 ادرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة بمائلي :  $f(x) = \sqrt{\frac{3x-1}{x-1}}$  على المجال  $]1, +\infty[$

2 ادرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة بمائلي :  $f(x) = \cos\left(\frac{x-1}{x^2+1}\right)$  على  $\mathbb{R}$

## 3 صورة مجال بدالة متصلة

## 1.3 صورة قطعة - صورة مجال

## خاصية

خاصية مقبولة

...

- صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة

- صورة مجال بدالة متصلة هي مجال


## ملاحظة

إذا كانت  $f$  دالة متصلة على مجال  $[a, b]$  فإن  $f([a, b]) = [m, M]$  حيث :  $m$  هي القيمة الدنيا ل  $f$  على  $[a, b]$  ، و  $M$  هي القيمة القصوى للدالة  $f$  على  $[a, b]$

## 2.3 صورة مجال بدالة متصلة ورتيبة قطعاً

لتكن  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $I$  لدينا النتائج التالية :

رتابة الدالة $f$	المجال $I$	المجال $f(I)$
$f$ تزايدية قطعاً على $I$	$[a, b]$	$[f(a), f(b)]$
	$[a, b[$	$f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$
	$]a, +\infty[$	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
	$\mathbb{R}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
$f$ تناقصية قطعاً على $I$	$[a, b]$	$[f(b), f(a)]$
	$[a, b[$	$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x), f(a)$
	$]a, +\infty[$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$
	$\mathbb{R}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$



#### 4 مبرهنة القيم الوسطية

لتكن  $f$  دالة عددية متصلة على مجال  $[a, b]$   
 بما أن  $f([a, b]) = [m, M]$  فإن  $f(a)$  و  $f(b)$  ينتميان إلى القطعة  $[m, M]$  ولكل عدد حقيقي  $k$  محصور بين  $f(a)$  و  $f(b)$  لدينا  
 $k \in [m, M]$  . إذن : يوجد على الأقل عنصر  $c$  من  $[a, b]$  بحيث  $f(c) = k$


مبرهنة

مبرهنة القيم الوسطية

لتكن  $f$  دالة متصلة على مجال  $I$  و  $a$  و  $b$  عنصرين من المجال  $I$  .  
 لكل عدد حقيقي  $k$  محصور بين  $f(a)$  و  $f(b)$  يوجد على الأقل عنصر  $c$  من  $[a, b]$  بحيث :  $f(c) = k$



## نشاط



نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  ب :  $f(x) = x^3 - 3$  وليكن  $(C_f)$  منحناها في معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  (أنظر الشكل جانبه).

1 بين أن  $f$  تزايدية و متصلة على  $[0, 2]$

2 أحسب  $f(0)$  و  $f(2)$  ثم استنتج  $f([0, 2])$

3 بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا في المجال  $[0, 2]$

## ملاحظة

إذا كانت  $f$  دالة متصلة على مجال  $[a, b]$  بحيث  $f(a) < 0$  و  $f(b) > 0$  (أو  $f(a) > 0$  و  $f(b) < 0$ ) فإن 0 محصور بين  $f(a)$  و  $f(b)$  و حسب مبرهنة القيم الوسطية فإنه يوجد على الأقل عنصر  $c$  من  $[a, b]$  بحيث :  $f(c) = 0$  . العدد  $c$  هو حل المعادلة  $f(x) = 0$

## نتيجة

...

- إذا كانت  $f$  دالة متصلة على مجال  $[a, b]$  بحيث  $f(a) \times f(b) < 0$  فإن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل على الأقل حل في  $]a, b[$
- إذا كانت  $f$  دالة متصلة و رتيبة قطعاً على مجال  $[a, b]$  بحيث  $f(a) \times f(b) < 0$  فإن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل على الأقل حل في  $]a, b[$

## تطبيقي تمرين

لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة بمالي :  $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 1$  بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل على الأقل حل في  $[-1, 1]$

## تطبيقي تمرين

لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة بمبايلي :  $f(x) = x^3 + x^2 + 4x - 1$   
بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا في  $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$

## 5 طريقة التفرع الثنائي

### نشاط

نعتبر الدالة العددية :  $f(x) = x^3 + x + 1$

- |   |  |
|---|--|
| 1 | بين أن $f$ متصلة على $[0, 1]$  |
| 2 | بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ محصورا بين 0 و 1                          |
| 3 | أحسب $f\left(\frac{1}{2}\right)$ وتحقق أن $\alpha \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$           |
| 4 | أحسب $f\left(\frac{3}{4}\right)$ وتحقق أن $\alpha \in \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$ |
| 5 | أحسب $f\left(\frac{5}{8}\right)$ وتحقق أن $\alpha \in \left[\frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right]$ |
| 6 | أحسب $f\left(\frac{11}{16}\right)$ واستنتج تأطيرا للعدد $\alpha$                             |
| 7 | أحسب $f(0,682)$ و $f(0,683)$ واستنتج تأطيرا للعدد $\alpha$ سعته $10^{-3}$                    |

هناك بعض المعادلات من نوع  $f(x) = 0$  لا يمكن حلها جبريا ؛ لكن يمكن تحديد قيمة مقربة لحل هذه المعادلة وذلك باستعمال طريقة التفرع الثنائي .

### طريقة

- لتكن  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على  $[a, b]$  و  $f(a)f(b) < 0$  إذن يوجد عدد وحيد  $\alpha$  حل للمعادلة  $f(x) = 0$  في المجال  $[a, b]$
- إذا كان  $f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$  فإن  $\frac{a+b}{2} < \alpha < b$  وهذا تأطير ل  $\alpha$  سعته  $\frac{b-a}{2}$   
نعيد هذه العملية بتعويض  $a$  ب  $\frac{a+b}{2}$  فنحصل على تأطير سعته  $\frac{b-a}{4}$  ...
  - إذا كان  $f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$  فإن  $a < \alpha < \frac{a+b}{2}$  وهذا تأطير ل  $\alpha$  سعته  $\frac{b-a}{2}$   
نعيد هذه العملية بتعويض  $b$  ب  $\frac{a+b}{2}$  فنحصل على تأطير سعته  $\frac{b-a}{4}$  ...

نعيد هذه العملية ككل إلى أن نحصل على التأطير المرغوب فيه

## تطبيقي تمرين

بين أن المعادلة  $x^3 + x + 1 = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  في المجال  $\left]-1, -\frac{1}{2}\right[$  ؛ ثم حدد تأطيرا للعدد  $\alpha$  سعته  $\frac{1}{8}$

## 6 الدالة العكسية لدالة متصلة

### 1.6 الدالة العكسية

#### نشاط

لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $[0, +\infty[$  ب :  $f(x) = x^3 + x^2 + 4x - 1$

1 بين أن  $f$  تزايدية قطعاً على  $[0, +\infty[$

2 تحقق أن  $f([0, +\infty[) \subset [-1, +\infty[$

3 بين أن كل عنصر  $y$  من  $[-1, +\infty[$  يقبل سابقاً وحيداً  $x$  من  $[0, +\infty[$  وأن  $x = \frac{1}{2}\sqrt{y+1}$

#### ملاحظة

...

- كل عنصر من  $[0, +\infty[$  له صورة وحيدة في  $[-1, +\infty[$  و كل عنصر من  $[-1, +\infty[$  له سابقاً وحيداً في  $[0, +\infty[$
- نقول إن  $f$  تقابل من  $[0, +\infty[$  نحو  $[-1, +\infty[$
- توجد دالة وحيدة يرمز لها ب  $f^{-1}$  معرفة على  $[-1, +\infty[$  ب  $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x+1}$  وتسمى الدالة العكسية للدالة  $f$

#### خاصية

إذا كانت  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $I$  فإن لكل عنصر  $y$  من  $J = f(I)$  المعادلة  $f(x) = y$  تقبل حلاً وحيداً في  $I$  نعبر عن هذا بقولنا  $f$  تقابل من  $I$  نحو  $J$

#### تعريف

لتكن  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $I$  و  $J = f(I)$  ، الدالة التي تربط كل عنصر  $y$  بالعنصر الوحيد  $x$  من  $I$  بحيث  $f(x) = y$  تسمى الدالة العكسية للدالة  $f$  نرمز لها ب  $f^{-1}$

#### نتائج

لتكن  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $I$  و  $f^{-1}$  دالتها العكسية لدينا :

$$(\forall y \in J) (\exists! x \in I) : f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

$$(\forall x \in I) : (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

$$(\forall y \in J) : (f \circ f^{-1})(y) = y$$

## تطبيقي تمرين

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة ب :  $f(x) = \sqrt{x-1}$

- 1 بين أن  $f$  متصلة ورتيبة قطعاً على  $[1, +\infty[$
- 2 استنتج أن  $f$  تقبل دالة عكسية معرفة على مجال  $I$  يجب تحديده
- 3 حدد  $f^{-1}(x)$  لكل  $x$  من  $I$

## تطبيقي تمرين

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $[0, +\infty[$  ب :  $f(x) = x^2$

- 1 بين أن  $f$  تقابل من  $I = [0, +\infty[$  نحو  $J = [0, +\infty[$
- 2 حدد  $f^{-1}$  الدالة العكسية للدالة  $f$
- 3 أنشئ في نفس المعلم المتعامد المنظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  المستقيم  $y = x$  والمنحنيين  $(\mathcal{C}_f)$  و  $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$  . ماذا تلاحظ ؟

## 2.6 خاصيات الدالة العكسية

### نشاط

- لتكن  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $I$  و  $f^{-1}$  دالتها العكسية :
- الدالة  $f^{-1}$  معرفة ومتصلة على  $J = f(I)$
  - الدالة  $f^{-1}$  رتيبة قطعاً على  $J = f(I)$  ولها نفس منحنى تغير الدالة  $f$
  - في المعلم المتعامد المنظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  منحنى الدالة  $f^{-1}$  متماثل مع منحنى الدالة  $f$  بالنسبة للمستقيم ذو المعادلة  $y = x$

## 7 دالة الجذر من الرتبة $n$

### خاصية

لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $I = [0, +\infty[$  ب :  $f(x) = x^n$   $n \in \mathbb{N}^*$  بين أن  $f$  تقبل دالة عكسية  $f^{-1}$  على مجال  $I$  يجب تحديده .

نعلم أن الدالة  $f(x) = x^n$   $(n \in \mathbb{N}^*)$  متصلة ورتيبة قطعاً على  $I = [0, +\infty[$  إذن تقبل دالة عكسية  $f^{-1}$  معرفة على  $J = f(I) = [0, +\infty[$

## خاصية و تعريف

...

- الدالة العكسية  $f^{-1}$  تسمى دالة الجذر من الرتبة  $n$
- الدالة العكسية  $f^{-1}$  يرمز لها ب  $\sqrt[n]{\phantom{x}}$   $f^{-1} = \sqrt[n]{\phantom{x}}$
- نكتب  $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$  أو أيضا  $f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{n}}$

## ملاحظة

...

- حالة  $n=1$  :  $f^{-1}(x) = \sqrt[1]{x} = x$
- حالة  $n=2$  :  $f^{-1}(x) = \sqrt[2]{x} = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$  (الجذر مربع)
- حالة  $n=3$  :  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$  (الجذر مكعب)

## خاصية

...

- في معلم متعامد ممنظم  $(\mathcal{E}_{f^{-1}})$  منحنى الدالة  $f(x)$  مع  $\sqrt[n]{x}$  منحنى الدالة  $f(x) = x^n$  بالنسبة للمنصف الأول (المستقيم  $(\Delta): y=x$ )

- $\sqrt[n]{1} = 1$  و  $\sqrt[n]{0} = 0$
- $(\sqrt[n]{x})^n = x$  و  $(\forall x \geq 0)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$

## نتائج

...

$$(\forall a \in \mathbb{R}^+) (\forall b \in \mathbb{R}^+) : \sqrt[n]{a} \leq \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a \leq b$$

$$(\forall a \in \mathbb{R}^+) (\forall b \in \mathbb{R}^+) : \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a = b$$

## مثال

$$\sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2 \quad ; \quad \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$$

## تطبيقي تمرين

حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات التالية :  $x^3 = 5$  ،  $x^3 = -9$  ،  $x^4 = 81$  ،  $x^3 = -8$



## خاصية

العمليات على الجذور من الرتبة  $n$

ليكن  $x$  و  $y$  عنصرين من  $\mathbb{R}^+$  و  $m$  و  $n$  عنصرين من  $\mathbb{N}^*$  لدينا :

$$(y \neq 0) : \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \cdot$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[nm]{x} \text{ و } \sqrt[n]{x} = \sqrt[nm]{x^m} \cdot$$

$$\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy} \cdot$$

$$(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m} \cdot$$

## تطبيقي تمرين

$$A = \frac{\sqrt[15]{3^5} \times \sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{9^5}}{\sqrt[3]{3}} \text{ : أحسب وبسط العدد } A \text{ حيث :}$$

## 1.7 القوة الجذرية لعدد حقيقي موجب

### تعريف

ليكن  $x$  عدد حقيقي موجب قطعاً و  $r$  عدداً جذرياً غير منعدم حيث  $(p, q) \in \mathbb{N}^{*2}$   $r = \frac{p}{q}$  القوة الجذرية للعدد الحقيقي  $x$  ذات الأساس  $r$  هي العدد الحقيقي  $x^r$  و المعرفة بمبايلي :  $x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$

### مثال

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}} \text{ ؛ } \sqrt{x^5} = x^{\frac{5}{2}} \text{ ؛ } \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$$

## خاصية

ليكن  $r$  و  $r'$  عددين جذريين و  $a$  و  $b$  عددين حقيقيين موجبين قطعاً لدينا :

$$a^r a^{r'} = a^{r+r'} \cdot$$

$$\frac{a^r}{b^{r'}} = a^{r-r'} \cdot$$

$$(a^r)^{r'} = a^{rr'} \cdot$$

$$\frac{a^r}{b^r} = \left(\frac{a}{b}\right)^r \cdot$$

$$\frac{1}{a^r} = a^{-r} \cdot$$

$$a^r b^r = (ab)^r \cdot$$

## تطبيقي تمرين

$$B = \frac{\sqrt[3]{7} \times 7^{\frac{2}{3}}}{7^{-\frac{1}{4}}} \text{ ؛ } A = \left(2^{-\frac{1}{3}}\right)^5 \times \left(4^{-\frac{1}{2}}\right) \times \left(8^{\frac{2}{3}}\right) \text{ : بسط العددين } A \text{ و } B \text{ حيث :}$$