

درس الاتصال

(الثانية علوم تجريبية)

(1) تذكير : النهايات

$$1. \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}^* \text{ لدينا : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{زوجي } n \\ -\infty & \text{فردى } n \end{cases}$$

2. نهاية دالة حدودية عند $+\infty$ أو $-\infty$ هي نهاية حدها الأعلى درجة

3. نهاية دالة جذرية هي خارج نهاية حدها الأعلى درجة في البسط على حدها الأعلى درجة في المقام

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{x} = a \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$$

5. جداول النهايات:

$\lim f$	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim f + g$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	شكل غير محدد

$\lim f$	l	$l > 0$	$l > 0$	$l < 0$	$l < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
$\lim g$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim f \times g$	$l \times l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	شكل غير محدد

تعريف 2:

✓ f متصلة في a على اليمين \Leftrightarrow

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = f(a)$$

✓ f متصلة في a على اليسار \Leftrightarrow

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a)$$

✓ f متصلة في a \Leftrightarrow

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a)$$

$$\text{مثال : أدرس اتصال الدالة } f \text{ في العدد } a=0 : \begin{cases} f(x) = \frac{\sin(2x)}{x} & ; x > 0 \\ f(x) = x^2 - x + 2 & ; x \leq 0 \end{cases}$$

لدينا : $f(0) = (0)^2 - (0) + 2 = 2$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sin(2x)}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} = 2$$

لنحسب $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$

لنحسب $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} x^2 - x + 2 = 2$$

بما أن : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = f(0)$

(3) الإتصال على مجال :

خاصيات :

- f متصلة على مجال $]a, b[$ يعني f متصلة في جميع عناصر المجال $]a, b[$
- f متصلة على مجال $]a, b[$ يعني f متصلة في جميع عناصر المجال $]a, b[$ و متصلة على يمين a و متصلة على يسار b
- f متصلة على مجال $]a, b[$ يعني f متصلة في جميع عناصر المجال $]a, b[$ و متصلة على يمين a
- f متصلة على مجال $]a, b[$ يعني f متصلة في جميع عناصر المجال $]a, b[$ و متصلة على يسار b

مثال :

$$f(x) = \frac{3x+5}{x+1} \text{ : نعتبر الدالة } f \text{ المعرفة بما يلي}$$

• لنبين أن g قصور f على المجال $[0;1]$ تقبل دالة عكسية g^{-1} معرفة على مجال J يتم تحديده :

✓ g قصور دالة جذرية معرفة على المجال $[0;1]$ إذن g متصلة على $[0;1]$

✓ g قصور دالة جذرية معرفة على المجال $[0;1]$ إذن g قابلة للاشتقاق على $[0;1]$

$$g'(x) = \left(\frac{3x+5}{x+1} \right)' = \frac{-2}{(x+1)^2} \text{ : ليكن } x \in [0;1]$$

إذن : $g'(x) < 0$ ($\forall x \in [0;1]$) و منه g تناقصية قطعاً على $[0;1]$

و بالتالي g تقبل دالة عكسية g^{-1} معرفة على مجال J نحو $[0;1]$

$$J = g([0;1]) = [g(1); g(0)] = [4;5] \text{ : بحيث}$$

• لنحدد : $(\forall x \in J) g^{-1}(x)$

✓ ليكن $x \in J = [4;5]$

$$y = g^{-1}(x) \Leftrightarrow x = g(y) \quad (y \in I = [0;1])$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{3y+5}{y+1}$$

$$\Leftrightarrow x \cdot (y+1) = 3y+5$$

$$\Leftrightarrow xy + x = 3y + 5$$

$$\Leftrightarrow xy - 3y = 5 - x$$

$$\Leftrightarrow y \cdot (x - 3) = 5 - x$$

$\lim f$	$l \neq 0$	0^+	0^-	$+\infty$	$-\infty$
$\lim \frac{1}{f}$	$\frac{1}{l}$	$+\infty$	$-\infty$	0	0

$\lim f$	l	$l > 0$	$l > 0$	$l < 0$	$l < 0$	l	$\pm\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim g$	$l' \neq 0$	0^+	0^-	0^+	0^-	$\pm\infty$	$\pm\infty$	0^+	0^-	0^+	0^-
$\lim \frac{f}{g}$	$\frac{l}{l'}$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0	شكل غير محدد	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

(2) اتصال دالة في عدد :

تعريف 1:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Leftrightarrow f \text{ متصلة في } a$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \frac{x^2 + 6x - 7}{x - 1} ; x \neq 1 \\ f(1) = 8 \end{array} \right. \quad \text{مثال : أدرس اتصال الدالة } f \text{ في العدد } a = 1$$

لدينا : $f(1) = 8$.

لنحسب $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 7)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 7) = 8$$

بما أن $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ فإن f متصلة في العدد 1 .

(4) العمليات على الدوال المتصلة

- الدوال الحدودية متصلة على \mathbb{R}
- الدوال الجذرية متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها
- الدوال المثلثية \sin و \cos متصلتان على \mathbb{R}
- دالة \tan متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها
- إذا كانت f و g متصلتان على مجال I فإن $f + g$ و $f \times g$ متصلتان على I
- إذا كانت f و g متصلتان على مجال I و $g \neq 0$ على I فإن $\frac{f}{g}$ و $\frac{1}{g}$ متصلتان على I .
- إذا كانت f متصلة على مجال I و $f \geq 0$ على I فإن \sqrt{f} متصلة على I .
- إذا كانت f متصلة على مجال I و g متصلة على J بحيث $f(I) \subset J$ فإن $g \circ f$ متصلة على I

أمثلة :

$$1. \quad f : x \mapsto x^3 - \frac{1}{2}x + 1 \text{ متصلة على } \mathbb{R}$$

$$2. \quad f : x \mapsto \frac{2x}{x-2} \text{ متصلة على كل مجال ضمن }]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[\text{ لأن } D_f =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[\text{ دالة جذرية}$$

$$3. \quad f : x \mapsto \cos x + x^2 - 7x + 3$$

$$\text{لدينا : } f_1 : x \mapsto \cos x \text{ متصلة على } \mathbb{R} \text{ و } f_2 : x \mapsto x^2 - 7x + 3 \text{ متصلة على } \mathbb{R}$$

$$\text{إذن } f = f_1 + f_2 \text{ متصلة على } \mathbb{R} \text{ كمجموع لدالتين متصلتين على } \mathbb{R}$$

$$4. \quad f : x \mapsto (x-1) \times \sin x$$

$$\text{لدينا : } f_1 : x \mapsto x-1 \text{ متصلة على } \mathbb{R} \text{ و } f_2 : x \mapsto \sin x \text{ متصلة على } \mathbb{R}$$

$$\text{إذن } f = f_1 \times f_2 \text{ متصلة على } \mathbb{R} \text{ كجاء لدالتين متصلتين على } \mathbb{R}$$

$$5. \quad f : x \mapsto \sqrt{x-2}$$

لدينا : $f_1: x \mapsto x - 2$ متصلة على $[2, +\infty[$ و لكل x من $[2, +\infty[$: $f_1(x) \geq 0$

إذن $f = \sqrt{f_1}$ متصلة على $[2, +\infty[$

$$f : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x^2+1} .6$$

لدينا : $f_1: x \mapsto \sqrt{x}$ متصلة على \mathbb{R}^+

و لدينا $f_2: x \mapsto x^2+1$ متصلة على \mathbb{R} بالخصوص على \mathbb{R}^+ و لكل x من \mathbb{R}^+ : $f_2(x) \neq 0$

إذن $f = \frac{f_1}{f_2}$ متصلة على \mathbb{R}^+ .

$$f : x \mapsto \sin\left(x^2 + \frac{\pi}{7}\right) .7$$

لدينا $f_1: x \mapsto x^2 + \frac{\pi}{7}$ حدودية متصلة على \mathbb{R} بحيث $f_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ و الدالة $f_2: x \mapsto \sin(x)$ متصلة

على \mathbb{R}

إذن $f = f_2 \circ f_1$ متصلة على \mathbb{R}

(5) صورة مجال بدالة متصلة و رتبية قطعا

$f(I)$	المجال I	
$[f(a), f(b)]$	$[a, b]$	f تزايدية قطعا
$\left[f(a), \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x) \right[$	$[a, b[$	
$\left] \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x), f(b) \right]$	$]a, b]$	
$\left] \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x), \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x) \right[$	$]a, b[$	
$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(a) \right]$	$] -\infty, a]$	
$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) \right[$	$] -\infty, a[$	
$\left[f(b), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$	$[b, +\infty[$	
$\left] \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x > b}} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right]$	$]b, +\infty[$	
$\left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$	$] -\infty, +\infty[$	
$[f(b), f(a)]$	$[a, b]$	
$\left] \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x), f(a) \right]$	$]a, b[$	
$\left[f(b), \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \right[$	$]a, b]$	
$\left] \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x < b}} f(x), \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \right]$	$]a, b[$	
$\left[f(a), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[$	$] -\infty, a]$	
$\left] \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right]$	$] -\infty, a[$	
$\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(b) \right]$	$[b, +\infty[$	
$\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{\substack{x \rightarrow b \\ x > b}} f(x) \right]$	$]b, +\infty[$	
$\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[$	$] -\infty, +\infty[$	

مثال 1:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة بما يلي : $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

لدينا : $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x-1 \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\} = \mathbb{R} - \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

لنحدد صور المجالات التالية : $[2;3]$ و $]1;+\infty[$ و $]-\infty;1[$ و $]1;4[$ و $]0;1[$

الدالة f قابلة للاشتقاق على كل مجال ضمن D_f (لأنها دالة جذرية)

ليكن $x \in D_f$

$$f'(x) = \left(\frac{2x+1}{x-1} \right)' = \frac{(2x+1)'(x-1) - (2x+1)(x-1)'}{(x-1)^2} = \frac{2 \cdot (x-1) - (2x+1) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x-2-2x-1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}$$

إذن : $f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2} < 0$ ($\forall x \in D_f$) . من الواضح أن $f'(x) < 0$ ($\forall x \in D_f$) و منه الدالة f تناقصية قطعاً

على D_f

$$f([2;3]) = [f(3);f(2)] = \left[\frac{7}{2}; 5 \right]$$

$$f(]1;+\infty[) = \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) \right] =]2;+\infty[$$

$$f(]-\infty;1[) = \left[\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right] =]-\infty;2[$$

$$f(]1;4]) = \left[f(4); \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) \right] = [3;+\infty[$$

$$f(]0;1[) = \left[\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x); f(0) \right] =]-\infty;-1]$$

مثال 2:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة بما يلي : $f(x) = x^3 + 7x - 2$
 الدالة f قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} لأنها دالة حدودية
 ليكن $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = (x^3 + 7x - 2)' = 3x^2 + 7$ إذن $f'(x) > 0$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)
 و منه الدالة f تزايدية قطعاً على \mathbb{R}

لنحدد صور المجالات التالية : $]-\infty; +\infty[$ و $[1; 3]$

$$f(]-\infty; +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[=]-\infty; +\infty[$$

$$f([1; 3]) = [f(1); f(3)] = [6; 46]$$

(6) مبرهنة القيم الوسيطة :

إذا كانت f متصلة على $[a; b]$ فإنه لكل λ محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ يوجد على الأقل c من $[a; b]$ بحيث
 $f(c) = \lambda$:

نتائج :

▪ مبرهنة القيم الوسيطة (وجودية الحل على $[a, b]$)

إذا كانت f متصلة على $[a, b]$ و $f(a) \times f(b) < 0$ فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً على الأقل في المجال $]a, b[$

مثال :

لنبين أن المعادلة : $x^4 + x - 3 = 0$ تقبل حلاً على الأقل في $]0; 2[$

✓ نعتبر الدالة f المعرفة ب : $f(x) = x^4 + x - 3$

• الدالة f متصلة على \mathbb{R} (لأنها دالة حدودية) بالخصوص على المجال $[0, 2]$

• لدينا $f(0) = -2$ و $f(2) = 15$ إذن $f(0) \times f(2) < 0$

و منه حسب مبرهنة القيم الوسيطة فإن المعادلة : $f(x) = 0$ تقبل حلا على الأقل في $]0;2[$

▪ مبرهنة القيم الوسيطة بالوحدانية (وجودية ووحدانية الحل على $]a,b[$).

إذا كانت f متصلة ورتبية قطعاً على $]a,b[$ و $f(a) \times f(b) < 0$ فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً في المجال $]a,b[$

مثال :

لنبين أن المعادلة $x^3 + 2x = 1$ تقبل حلاً وحيداً في المجال $[0,1]$ ($x^3 + 2x = 1 \Leftrightarrow x^3 + 2x - 1 = 0$)

✓ نعتبر الدالة f المعرفة ب : $f(x) = x^3 + 2x - 1$

• الدالة f متصلة على \mathbb{R} (لأنها دالة حدودية) بالخصوص على المجال $[0,1]$

• الدالة f قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} (لأنها دالة حدودية) بالخصوص على المجال $[0,1]$

ليكن $f'(x) = (x^3 + 2x - 1)' = 3x^2 + 2 : x \in [0;1]$

إذن : $f'(x) > 0$ ($\forall x \in \mathbb{R}$) و منه f تزايدية قطعاً على $[0,1]$

• $f(0) = -1$ و $f(1) = 2$ إذن $f(0) \times f(1) < 0$

و منه حسب مبرهنة القيم الوسيطة بالوحدانية فإن المعادلة : $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً في $[0;1]$

▪ مبرهنة (وجودية ووحداية الحل على مجال I)

إذا كانت f متصلة ورتيبة قطعاً على I و $0 \in f(I)$ فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً في المجال I

مثال :

لنبين أن المعادلة $2x^3 + 5x - 4 = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في \mathbb{R} ثم تحقق أن $0 < \alpha < 1$

✓ نعتبر الدالة f المعرفة ب : $f(x) = 2x^3 + 5x - 4$

• الدالة f متصلة على \mathbb{R} (لأنها دالة حدودية)

• الدالة f قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} (لأنها دالة حدودية)

ليكن $x \in \mathbb{R} : f'(x) = (2x^3 + 5x - 4)' = 3x^2 + 5$

إذن : $f'(x) > 0$ ($\forall x \in \mathbb{R}$) و منه f تزايدية قطعاً على \mathbb{R}

• لنحسب $f(\mathbb{R}) = f(]-\infty; +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty; +\infty[= \mathbb{R} : f(\mathbb{R})$

إذن : $0 \in f(\mathbb{R})$

و بالتالي المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في \mathbb{R}

✓ لنتحقق أن $0 < \alpha < 1$:

• الدالة f متصلة $[0, 1]$

• $f(0) = -4$ و $f(1) = 3$ إذن $f(0) \times f(1) < 0$

إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطة فإن : $0 < \alpha < 1$

(7) الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا :

خاصية :

إذا كانت f دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال I فإن f تقبل دالة عكسية f^{-1} معرفة من مجال $J = f(I)$ نحو

I

نتائج:


$$(1) \begin{cases} y = f^{-1}(x) \\ x \in J \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} f^{-1} \circ f(x) = x & ; x \in I \\ f \circ f^{-1}(x) = x & ; x \in J \end{cases}$$

خاصيات:

لتكن f دالة و f^{-1} دالتها العكسية على المجال J لدينا :

- f^{-1} متصلة على المجال J
- f و f^{-1} لهما نفس الرتبة
- منحنى f^{-1} هو مماثل لمنحنى f بالنسبة للمستقيم ذي المعادلة $y = x$ (المنصف الأول للمعلم)



$$\Leftrightarrow y = \frac{5-x}{x-3}$$

إذن : $(\forall x \in J = [4;5]) \quad g^{-1}(x) = \frac{5-x}{x-3}$

(8) الجذر من الرتبة n ($n \in \mathbb{N}^*$)

أ. تعريف :

ليكن n من \mathbb{N}^*

الدالة العكسية للدالة $x \mapsto x^n$ على المجال $[0, +\infty[$ تسمى دالة الجذر من الرتبة n و نرمز لها ب : $x \mapsto \sqrt[n]{x}$
الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ متصلة و تزايدية قطعاً على $[0, +\infty[$

ب. أمثلة :

$$(n=1) \quad \sqrt[n]{x} = x$$

$$(n=2) \quad \sqrt[n]{x} = \sqrt{x} \quad (\text{الجذر المربع})$$

$$(n=3) \quad \sqrt[n]{x} = \sqrt[3]{x} \quad (\text{الجذر المكعب})$$

ج. خصائص :

ليكن x و y عدنان حقيقيان موجبان. لدينا :

$$\sqrt[n]{x^m} = \sqrt[n]{x^m} \quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[mn]{x} \quad \sqrt[n]{x^n} = x \quad (\sqrt[n]{x})^n = x$$

$$(y \neq 0) \quad \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \quad \sqrt[n]{x \cdot y} = \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y}$$

أمثلة :

أ. لنبسظ ما يلي :

$$a = \sqrt[3]{27} \quad b = \sqrt[4]{16} \quad c = \sqrt{\sqrt[3]{729}}$$

$$a = \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$$

$$b = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2$$

$$c = \sqrt{\sqrt[3]{729}} = \sqrt{\sqrt[3]{3^6}} = \sqrt{3^2} = 3$$

ب. قارن العدان : $x = \sqrt[3]{4}$ و $y = \sqrt[4]{5}$

لدينا : $x = \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{4^4} = \sqrt[12]{256}$ و $y = \sqrt[4]{5} = \sqrt[4]{5^3} = \sqrt[12]{125}$

بما أن $125 < 256$ فإن $\sqrt[12]{125} < \sqrt[12]{256}$ و منه $y < x$

ج. اجعل مقام العدد التالي جذريا : $\frac{1}{\sqrt[3]{4}-1}$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{4}-1} = \frac{1}{(\sqrt[3]{4})^3 - 1^3} = \frac{(\sqrt[3]{4})^2 + \sqrt[3]{4} + 1^2}{(\sqrt[3]{4})^3 - 1^3} = \frac{(\sqrt[3]{4})^2 + \sqrt[3]{4} + 1}{4-1} = \frac{(\sqrt[3]{4})^2 + \sqrt[3]{4} + 1}{3}$$

د. خاصية:

لتكن f دالة و $n \in \mathbb{N}^*$

➤ إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = +\infty$

➤ إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ و $l \geq 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{l}$

➤ إذا كانت f متصلة و موجبة على مجال I فإن $\sqrt[n]{f}$ متصلة على I

أمثلة :

1. لنحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{x^2 + x - 1}$:

لدينا : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + x - 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{x^2 + x - 1} = +\infty$

2. لنحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{\frac{8x}{x+1}}$:

لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x}{x} = 8$ إذن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{\frac{8x}{x+1}} = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$

3. لندرس اتصال الدالة : $h : x \mapsto \sqrt[3]{x^2}$

لدينا : $x \mapsto x^2$ متصلة على \mathbb{R} و $f(x) \geq 0$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)

إن الدالة $h = \sqrt[3]{f}$ متصلة على \mathbb{R}

(9) القوى الجذرية لعدد حقيقي:

أ. تعريف:

ليكن n و m من \mathbb{N}^* و $x > 0$ لدينا:

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}} \quad \text{و} \quad \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$$

أمثلة:

$$5^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{5^3} \quad \bullet$$

$$4^{-\frac{5}{2}} = \frac{1}{4^{\frac{5}{2}}} = \frac{1}{\sqrt[2]{4^5}} = \frac{1}{\sqrt[2]{2^{10}}} = \frac{1}{2^{10}} \quad \bullet$$

ب. خاصية:

لكل عددين حقيقيين موجبين قطعا x و y و لكل r و r' من \mathbb{Q}^* :

$$(x^r)^{r'} = x^{r \cdot r'} \quad \bullet \quad x^r \cdot y^r = (x \cdot y)^r \quad \bullet \quad x^{r+r'} = x^r \cdot x^{r'} \quad \bullet$$

$$\frac{x^r}{x^{r'}} = x^{r-r'} \quad \bullet \quad \frac{x^r}{y^r} = \left(\frac{x}{y}\right)^r \quad \bullet \quad \frac{1}{x^r} = x^{-r} \quad \bullet$$

مثال:

$$A = \frac{\sqrt[3]{8} \times \sqrt[4]{32}}{\sqrt{2} \times \sqrt[12]{64}} \quad \text{لنبسط العدد}$$

$$A = \frac{\sqrt[3]{8} \times \sqrt[4]{32}}{\sqrt{2} \times \sqrt[12]{64}} = \frac{\left(8^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} \times \left(32^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{1}{2}} \times 64^{\frac{1}{12}}} = \frac{8^{\frac{1}{6}} \times 32^{\frac{1}{8}}}{2^{\frac{1}{2}} \times 64^{\frac{1}{12}}} = \frac{(2^3)^{\frac{1}{6}} \times (2^5)^{\frac{1}{8}}}{2^{\frac{1}{2}} \times (2^6)^{\frac{1}{12}}} = \frac{2^{\frac{3}{6}} \times 2^{\frac{5}{8}}}{2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{6}{12}}} = \frac{2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{5}{8}}}{2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}}} = 2^{\frac{5}{8} - \frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{8}} = \sqrt[8]{2}$$

つづく