

النهايات و الاتصال
التمرين الأول :

احسب النهايات التالية :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x^2 - 1}$	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x-2}-1}{\sqrt{4-x}-1}$	$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} \frac{x^2+4}{x^2-1}$	$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{x^2-x-12}$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+x} - x$	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{x+5}-2}{\sqrt{x+1}-2}$	$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sqrt{1-\cos x}}{x}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin 5x}{x^2}$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+\sqrt{x-1}}{x+\sqrt{x^2-1}}$	$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+\sqrt{2-x}-6}{x^2-x-6}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-\sin 3x}{x+\sin 2x}$	$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{3}{x}\right)$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-\sqrt{x^2+3\sqrt{x}}}{\sqrt{x+3}-\sqrt{x}}$	$\lim_{\substack{x \rightarrow \pi \\ x > \frac{\pi}{2}}} \frac{\cos x - 2}{1 - \sin x}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x}$	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{4-x}}{\sqrt{x} - \sqrt{2}}$

التمرين الثاني :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} & ; \quad x > 0 \\ f(0) = \frac{1}{4} \\ f(x) = \frac{2}{x^2} \left(1 - \cos\left(\frac{x}{2}\right)\right) & ; \quad x < 0 \end{cases}$$

نعتبر الدالة العددية f المعرفة بما يلي :

1) يبيه أن f منصولة على يسار النقطة 0

2) هل الدالة f منصولة في النقطة 0 ؟

manti.1s.fr

التمرين الثالث :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2+x-m}{x^2-1} & ; \quad x > 1 \\ f(1) = \frac{3}{2} \\ f(x) = \frac{1-\sqrt{2-x}}{\sqrt[3]{x}-1} & ; \quad 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

لذلك m عدداً حقيقياً و نعتبر الدالة f المعرفة على $[0, +\infty]$ بما يلي :

1) أدرس اتصال الدالة f على يسار 1

2) أ- حدد تبعاً لقيم m النهاية $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x)$

ب- استنتج m كي تكون f منصولة في النقطة 1

التمرين الرابع :

$$\begin{cases} f(x) = x & ; \quad x > a \\ f(x) = \frac{-1}{\sqrt{3-2x}} & ; \quad x \leq a \end{cases}$$

لذلك a عدداً في $(-\infty, 0]$ و نعتبر الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بما يلي :

1) أنشر $(x-1)^2(2x+1)$

2) حدد العدد a كي تكون الدالة f منصولة في النقطة a

التمرين الثالث :

يبقى أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل على الأقل حلًا في المجال I في الحالات التالية

$$I = [-1, 0] \quad \text{و} \quad f(x) = 3x^3 - x + 1 \quad (1)$$

$$I = [1, 2] \quad \text{و} \quad f(x) = x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} - 3 \quad (2)$$

$$I = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \quad \text{و} \quad f(x) = x - 2 \cos x \quad (3)$$

التمرين السادس :

نعتبر الدالة العددية f المعرفة بما يلي :

(1) أدرس منحى تغيرات الدالة f و ببأه أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدا α و أه $\alpha \in [1, 2]$

(2) حدد إشارة f و استنتج تأطيرًا آخر للعدد α

(3) حدد تأطيرًا للعدد α سعنه 0,25

manti.1s.fr

التمرين السابع :

حدد صورة المجال I بالدالة f في كل من الحالات التالية :

$$I = [2, 3] \quad \text{و} \quad f(x) = x^2 - 2x \quad (1)$$

$$I =]-\infty, 1] \quad \text{و} \quad f(x) = \frac{x}{x-2} \quad (2)$$

$$I = [0, +\infty[\quad \text{و} \quad f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}+1} \quad (3)$$

$$I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \quad \text{و} \quad f(x) = x - \sin x \quad (4)$$

التمرين الثامن :

لتكن f الدالة المعرفة على المجال $[2, +\infty[$ بما يلي :

(1) ببأه f تقبل دالة عكسية f^{-1} معرفة على مجال J يتم تحديده

(2) أحسب J لك x تلبي $f^{-1}(x)$

(3) أرسم في نفس المعلم المنحني $(C_{f^{-1}})$ و (C_f)

التمرين التاسع :

نعتبر الدالة العددية h المعرفة بما يلي :

(1) حدد D_h مجموعه تعريف الدالة h

(2) ببأه h تزايدية على D_h (أنش $(\sqrt{x+1}-1)^2$)

(3) أ- ببأه h تقبل دالة عكسية h^{-1} محددا مجموعه تعريفها

ب- أحسب $h^{-1}(x)$

التمرين العاشر :

$$(1) \text{ ببأه } \exists! \alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right] \text{ و } \cos \alpha = \alpha$$

(2) نعتبر الدالة f المعرفة على $[0, \pi]$ بما يلي :

أ- ببأه f تقبل دالة عكسية محددا مجموعه تعريفها D

$$\text{ب- حدد } f^{-1}(\alpha) \quad \text{و} \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \quad , \quad f^{-1}(1)$$