

## الاشتقاق و تطبيقاته - دراسة الدوال

الثانية سلك بكالوريا ع ف - ع ح أ

### I- الاشتقاق في نقطة- الدالة المشتقة

#### (A) أنشطة

**نشاط 1** باستعمال التعريف ادرس اشتقاق الدالة  $f$  في  $x_0$  و حدد العدد المشتق في  $x_0$  إن وجد ثم حدد معادلة المماس أو نصف المماس لمنحنى الدالة  $f$  عند النقطة ذات الأضلاع  $x_0$  في الحالات التالية

أ-  $f(x) = x^2 - 2x$   $x_0 = 1$  - ب  $f(x) = x^2 - 4$   $x_0 = 2$

ج-  $x_0 = 0$   $\begin{cases} f(x) = \sin x & x \leq 0 \\ f(x) = x^3 - 2x & x > 0 \end{cases}$

**نشاط 2** حدد الدالة المشتقة  $f'$  للدالة  $f$  بعد تحديد مجموعة تعريف كل من  $f$  و  $f'$  في الحالات التالية

أ-  $f(x) = -2x^4 + 3x^2 - 1$  - ب  $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-1}$

ج-  $f(x) = \sin 2x \cos x$  - د  $f(x) = x^2 + \sqrt{x}$  - ر  $f(x) = 1 + \tan^2 x$

#### نشاط 3

حدد  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + \cos \pi x}{x-1}$   $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{x - \frac{\pi}{2}}$

#### (B) تذكير

### 1- الاشتقاق في نقطة

#### أ- تعريف

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة في مجال مفتوح مركزه  $x_0$

نقول إن الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق في  $x_0$  إذا كانت للدالة  $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$  نهاية  $l$  في  $x_0$  ونرمز لها بـ

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

العدد  $l$  يسمى العدد المشتق لـ  $f$  في  $x_0$ . نكتب

#### ب- خاصة

كل دالة قابلة للاشتقاق في  $x_0$  تكون متصلة في  $x_0$

### 2- الاشتقاق على اليمين - الاشتقاق على اليسار

#### أ- تعريف

\* لتكن  $f$  دالة معرفة على مجال من شكل  $[x_0; x_0+a]$  حيث  $a > 0$

نقول إن  $f$  قابلة للاشتقاق على اليمين في  $x_0$  إذا كانت للدالة  $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$  نهاية  $l$  على اليمين في

$x_0$  ونرمز لها بـ  $f'_d(x_0)$ .

$$f'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

العدد  $l$  يسمى العدد المشتق لـ  $f$  على اليمين في  $x_0$  نكتب

\* لتكن  $f$  دالة معرفة على مجال من شكل  $[x_x - \alpha; x_0]$  حيث  $\alpha > 0$

نقول إن  $f$  قابلة للاشتقاق على اليسار في  $x_0$  إذا كانت للدالة  $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$  نهاية  $l$  على اليسار في

$x_0$  ونرمز لها بـ  $f'_g(x_0)$ .

$$f'_g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

العدد  $l$  يسمى العدد المشتق لـ  $f$  على اليسار في  $x_0$  نكتب

#### ب- خاصة

تكون  $f$  قابلة للاشتقاق في  $x_0$  إذا وفقط إذا كانت  $f$  قابلة للاشتقاق على اليمين وعلى اليسار في  $x_0$  والعدد المشتق على اليمين يساوي العدد المشتق على اليسار.

### 3- الدالة المشتقة

#### أ- تعريف

نقول إن  $f$  قابلة للاشتقاق على المجال  $I$  إذا كانت  $f$  قابلة للاشتقاق في كل نقطة من  $I$ .  
الدالة التي تربط كل عنصر  $x$  من  $I$  بالعدد  $f'(x)$  تسمى الدالة المشتقة نرمز لها بـ  $f'$ .

#### ب- عمليات على الدوال المشتقة

\*- لتكن  $f$  و  $g$  دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال  $I$  و  $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\forall x \in I \quad (f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

$$(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$(\lambda f)' = \lambda f'(x)$$

$$\forall x \in I \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} \quad \left(\frac{1}{g}\right)'(x) = -\frac{g'(x)}{g(x)}$$

\*- لتكن  $f$  دالة قابلة للاشتقاق على مجال  $I$  و  $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$  و  $\forall x \in I$  بحيث  $g$  لا تنعدم على  $I$

- لتكن  $f$  دالة قابلة للاشتقاق على مجال  $I$  و  $n \in \mathbb{Z}_-$  و  $f$  لا تنعدم على  $I$

$$\forall x \in I \quad (f^n)'(x) = n(f(x))^{n-1} \times f'(x)$$

#### 4- الكتابة التفاضلية

إذا كانت  $y = f(x)$  و  $f$  قابلة للاشتقاق على المجال  $I$  فاننا نكتب اصطلاحا  $\frac{dy}{dx} = f'(x)$  أو  $dy = f'(x)dx$

هذه الكتابة تسمى: الكتابة التفاضلية.





#### 5- التآويل الهندسي - معادلة المماس لمنحنى دالة

##### أ- المماس

لتكن  $f$  دالة معرفة على مجال مفتوح مركزه  $x_0$  و  $C_f$  منحنىها  
قابلية اشتقاق  $f$  في  $x_0$  تؤول هندسيا بوجود مماس لـ  $C_f$   
عند النقطة ذات الأفصول  $x_0$  معادلته  $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

##### ب- نصف المماس

إذا كانت  $f$  قابلة للاشتقاق على اليمين في  $x_0$  (أو على اليسار في  $x_0$ ) فان  $C_f$  يقبل نصف مماس عند النقطة ذات الأفصول  $x_0$  معامل الموجه  $f'_d(x_0)$  (أو  $f'_g(x_0)$ )



$$(T_1): y = f'_d(x - x_0) + f(x_0) \quad x \geq x_0$$

$$(T_2): y = f'_g(x - x_0) + f(x_0) \quad x \leq x_0$$

$$\begin{cases} (T_2): y = f'_g(x - x_0) + f(x_0) \\ x \leq x_0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} (T_1): y = f'_d(x - x_0) + f(x_0) \\ x \geq x_0 \end{cases}$$

$M_0$  نقطة مزواة

## ج- نصف مماس مواز لمحور الأرتاب

إذا كانت  $f$  متصلة في  $x_0$  و كان  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$  أو  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$  فان

$C_f$  نصف مماس مواز لمحور الأرتاب.



## II- مشتقة دالة مركبة - مشتقة الدالة العكسية

### 1- مشتقة دالة مركبة

#### خاصة

لتكن  $f$  دالة قابلة للاشتقاق على مجال  $I$  و  $g$  قابلة للاشتقاق على  $f(I)$  فان  
إذا كان  $x_0$  عنصرا من  $I$  و كانت  $f$  قابلة للاشتقاق في  $x_0$  و  $g$  قابلة للاشتقاق في  $f(x_0)$  فان  
 $g \circ f$  قابلة للاشتقاق في  $x_0$ .

#### خاصة

لتكن  $f$  دالة قابلة للاشتقاق على مجال  $I$  و  $g$  قابلة للاشتقاق على  $f(I)$   
$$\forall x \in I \quad (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$$

#### نتيجة

إذا كانت  $f$  دالة قابلة للاشتقاق على مجال  $I$  و موجبة قطعاً على  $I$  و  $g$  دالة معرفة على  $I$  بـ  $g(x) = \sqrt{f(x)}$   
فان  $g$  قابلة للاشتقاق على  $I$  و  
$$\forall x \in I \quad g'(x) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$$

**تمرين** أحسب  $f'(x)$  بعد تحديد مجموعة تعريف الدالة المشتقة  $f'$  في الحالتين التاليتين

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x} \quad (b) ; \quad f(x) = \cos(x^3 - 4x^2) \quad (a)$$

## 2- مشتقة الدالة العكسية

### خاصة

لتكن  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $I$   
إذا كان  $x_0$  عنصراً من  $I$  و كانت  $f$  قابلة للاشتقاق في  $x_0$  و  $f'(x_0) \neq 0$  فان الدالة  $f^{-1}$  للاشتقاق في  $f(x_0)$  و  
$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

**مثال :** نعتبر  $f(x) = \tan x \quad \forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$  نحدد  $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$  ثم  $(f^{-1})'(1)$

$$\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[ \quad f'(x) = 1 + \tan^2 x \quad \text{لدينا} \quad f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2} \quad \text{أي} \quad (f^{-1})'\left(f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{1}{f'\left(\frac{\pi}{4}\right)} \quad \text{ومنه} \quad f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \neq 0$$

### خاصة

إذا  $f$  دالة رتيبة قطعاً و قابلة للاشتقاق على مجال  $I$  و  $f'$  لا تنعدم على  $I$  فان الدالة  $f^{-1}$  قابلة

$$\forall x \in f(I) \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad \text{و} \quad f(I)$$

### 3- تطبيقات

#### أ مشتقة دالة الجذر من الرتبة n

لدينا الدالة  $f: x \rightarrow x^n$  تزايدية قطعاً وقابلة للاشتقاق على  $]0; +\infty[$  ولا تنعدم على  $]0; +\infty[$

$$f'(x) = nx^{n-1} \quad \text{و} \quad f(]0; +\infty[) = ]0; +\infty[$$

ومنه الدالة العكسية  $f^{-1}: x \rightarrow \sqrt[n]{x}$  قابلة للاشتقاق على  $]0; +\infty[$

$$\forall x \in ]0; +\infty[ \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\sqrt[n]{x})} = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$$

#### خاصة

ليكن  $n \in \mathbb{N}^*$ . الدالة  $x \rightarrow \sqrt[n]{x}$  قابلة للاشتقاق على  $]0; +\infty[$  ولدينا  $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$

#### ملاحظة

$$(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}} = \frac{1}{n}(\sqrt[n]{x})^{1-n} = \frac{1}{n}\left(x^{\frac{1}{n}}\right)^{1-n} = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$$

$$(\sqrt[n]{x})' = \left(x^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$$

#### نتيجة

$$(p; q) \in \mathbb{N}^{*2} \quad \frac{p}{q} \quad \text{حيث} \quad (x^r)' = \left(\sqrt[q]{x^p}\right)' = px^{p-1} \times \frac{1}{q}\left(x^p\right)^{\frac{1}{q}-1} = \frac{p}{q}x^{\frac{p}{q}-1} = rx^{r-1}$$

#### نتيجة

ليكن  $r$  من  $\mathbb{Q}^*$ . الدالة  $x \rightarrow x^r$  قابلة للاشتقاق على  $]0; +\infty[$  ولدينا  $(x^r)' = rx^{r-1}$

#### تمرين

$$g(x) = x^{\frac{2}{3}} \quad f(x) = x^2 + \sqrt[3]{x}$$

أدرس اشتقاق  $f$  و  $g$  و حدد الدالتين المشتقتين لهما

#### خاصة

إذا كانت  $f$  دالة قابلة للاشتقاق على مجال  $I$  و  $f$  موجبة قطعاً على  $I$  و  $n \in \mathbb{N}^*$  فان الدالة  $x \rightarrow \sqrt[n]{f(x)}$

$$\left(\left(f(x)\right)^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n}\left(f(x)\right)^{\frac{1}{n}-1} \cdot f'(x) \quad \forall x \in I \quad \left(\sqrt[n]{f(x)}\right)' = \frac{f'(x)}{n\left(\sqrt[n]{f(x)}\right)^{n-1}}$$

#### نتيجة

لتكن  $f$  دالة قابلة للاشتقاق على مجال  $I$  و  $f$  موجبة قطعاً على  $I$  و  $r \in \mathbb{Q}$ .

$$\forall x \in I \quad \left(\left(f(x)\right)^r\right)' = r\left(f(x)\right)^{r-1} \cdot f'(x)$$

**تمرين** أحسب الدالة المشتقة  $f'$  للدالة  $f$  بعد تحديد  $D_f$  و  $D_{f'}$  في كل حالة من الحالات التالية

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 2x} - 1 \quad \text{مع إعطاء جدول التغيرات} \quad f(x) = \sqrt[3]{(2x-1)^2} - 2 \quad f(x) = (\sqrt[3]{2x-1})^2 - 2$$

$$f(x) = (x^2 - 1)^{\frac{2}{5}} - 3 \quad f(x) = \left(\left(x^2 - 1\right)^2\right)^{\frac{1}{5}} - 4$$

الدالة  $\arctan$  هي الدالة العكسية للدالة  $f$  المعرفة من  $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$  نحو  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = \tan x$

بما أن  $f$  قابلة للاشتقاق و موجبة قطعاً على  $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$  ( $f'(x) = 1 + \tan^2 x$ ) فإن الدالة  $\arctan$  قابلة

للاشتقاق على  $\mathbb{R}$  و  $\arctan'x = \frac{1}{f'(\arctan x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{x^2 + 1}$

**خاصية**

\* الدالة  $\arctan$  قابلة للاشتقاق على  $\mathbb{R}$  و  $\arctan'x = \frac{1}{x^2 + 1}$   $\forall x \in \mathbb{R}$

**خاصية**

\* إذا كانت الدالة  $u$  قابلة للاشتقاق على  $I$  فإن الدالة  $\arctan \circ u$  قابلة للاشتقاق على  $I$

و  $\forall x \in I \quad (\arctan \circ u(x))' = \frac{u'(x)}{1 + (u(x))^2}$

**تمرين 1-** أحسب مشتقة  $f$  بعد تحديد حيز تعريفها في الحالتين

$$f(x) = \arctan \sqrt[3]{x} \quad f(x) = \arctan \sqrt{\frac{2-x}{x}}$$

2- حدد  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^2 + 3x)}{x}$

**جدول مشتقات بعض الدوال**

$D_{f'}$	$f'(x)$	$f(x)$
$\mathbb{R}$	0	$a$
$\mathbb{R}$	1	$x$
$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$
$\mathbb{R}$	$nx^{n-1}$	$n \in \mathbb{N}^* - \{1\} \quad x^n$
$\mathbb{R}^*$	$nx^{n-1}$	$n \in \mathbb{Z}^{*-} \quad x^n$
$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$
$\{x \in D_u / u(x) > 0\}$	$\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$	$\sqrt{u(x)}$
$]0; +\infty[$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$	$n \in \mathbb{N}^* \quad x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$
$\{x \in D_u / u(x) > 0\}$	$\frac{u'(x)}{n(\sqrt[n]{u(x)})^{n-1}}$	$\sqrt[n]{u(x)}$
$]0; +\infty[$	$rx^{r-1}$	$r \in \mathbb{Q} \quad x^r$
$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\cos x$
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x$

$\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$	$1 + \tan^2 x$	$\tan x$
$\mathbb{R}$	$-a \sin(ax + b)$	$\cos(ax + b)$
$\mathbb{R}$	$a \cos(ax + b)$	$\sin(ax + b)$
$\mathbb{R}$	$\frac{1}{x^2 + 1}$	$\arctan x$
$D_{u'}$	$\frac{u'(x)}{(u(x))^2 + 1}$	$\arctan(u(x))$

### III- الدوال الأصلية

#### تعريف

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال  $I$ . نقول إن دالة  $F$  هي دالة أصلية للدالة  $f$  على  $I$  إذا كانت  $F$  قابلة للاشتقاق على  $I$  وكان  $\forall x \in I \quad F'(x) = f(x)$

#### أمثلة

الدالة  $F : x \rightarrow x^2 + 2x$  دالة أصلية للدالة  $f : x \rightarrow 2x + 2$  على  $\mathbb{R}$   
الدالة  $F : x \rightarrow \cos x + 3$  دالة أصلية للدالة  $f : x \rightarrow -\sin x$  على  $\mathbb{R}$

#### خاصة

لتكن  $f$  دالة عددية تقبل دالة أصلية  $F$  على مجال  $I$  هي المجموعة المكونة من الدوال  $F + \lambda$  حيث  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

#### أمثلة

- الدالة  $F : x \rightarrow x^2 + 2x$  دالة أصلية للدالة  $f : x \rightarrow 2x + 2$  على  $\mathbb{R}$   
إذن الدوال الأصلية لـ  $f$  هي الدوال  $F_\lambda$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $F_\lambda(x) = x^2 + 2x + \lambda$

#### خاصة

لتكن  $f$  دالة عددية تقبل دالة أصلية على مجال  $I$  ليكن  $x_0$  من  $I$  و  $y_0$  من  $\mathbb{R}$  توجد دالة أصلية وحيدة  $G$  للدالة  $f$  على مجال  $I$  بحيث  $G(x_0) = y_0$ .

#### مثال

نحدد دالة أصلية للدالة  $f$  على  $\mathbb{R}$  حيث  $f(x) = x^3 - 2x + 3$  التي تأخذ القيمة 2 عند 1

#### خاصة

إذا كانت  $F$  و  $G$  دالتين أصليتين للدالتين  $f$  و  $g$  على مجال  $I$  على التوالي وكان  $\lambda \in \mathbb{R}$  فإن  
\*  $F + G$  دالة أصلية لـ  $f + g$   
\*  $\lambda F$  دالة أصلية لـ  $\lambda f$

#### خاصة

كل دالة متصلة على مجال  $I$  تقبل دالة أصلية على  $I$

**مثال** بين أن  $f$  تقبل دالة أصلية على  $\mathbb{R}$  و حدد الدوال الأصلية لـ  $f$ .  

$$\begin{cases} f(x) = x - 3 & x \geq 2 \\ f(x) = x^2 - 5 & x < 2 \end{cases}$$

### جدول الدوال الأصلية لبعض الدوال الاعتيادية

مجموعة التعريف $I$ للدالة $f$ و الدوال $F$	الدوال الأصلية $F$	الدالة $f$
$I = \mathbb{R}$	$\lambda$	0
$I = \mathbb{R}$	$ax + \lambda$	$a$
$I = \mathbb{R}$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + \lambda$	$n \in \mathbb{N}^* \quad x^n$
$I = \mathbb{R}_-^*$ ou $I = \mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + \lambda$	$n \in \mathbb{Z}^* - \{-1\} \quad x^n$

$I = \mathbb{R}_-^*$ ou $I = \mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + \lambda$	$n \in \mathbb{Z}^* - \{-1\}$ $x^n$
$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{r+1}x^{r+1} + \lambda$	$r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\}$ $x^r$
$I = \mathbb{R}$	$\frac{1}{a}\sin(ax+b) + \lambda$	$\cos(ax+b)$ $a \neq 0$
$I = \mathbb{R}$	$-\frac{1}{a}\cos(ax+b) + \lambda$	$\sin(ax+b)$ $a \neq 0$
$I = \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right[ ; k \in \mathbb{Z}$	$\tan x + \lambda$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$I = \mathbb{R}$	$\arctan x + \lambda$	$\frac{1}{x^2 + 1}$
$I$ هو المجال التي تكون فيه $f^r$ معرفة و $f$ قابلة للاشتقاق	$\frac{1}{r+1}f^{r+1} + \lambda$	$r \in \mathbb{Q}^* - \{-1\}$ $f^r \cdot f'$
$I$ هو المجال التي تكون فيه $g$ و $f$ قابلتان للاشتقاق	$f + g + \lambda$	$f + g$
$I$ هو المجال التي تكون فيه $g$ و $f$ قابلتان للاشتقاق	$fg + \lambda$	$f'g + fg'$
$I$ هو المجال التي تكون فيه $g$ و $f$ قابلتان للاشتقاق و لا تنعدم فيه $g$	$\frac{f}{g} + \lambda$	$\frac{f'g - fg'}{g^2}$

### تمارين

حدد دالة أصلية للدالة  $f$  على  $]1; +\infty[$   $f(x) = x(x^2 - 1)^{\frac{1}{3}} - 1$

(لاحظ أن  $f(x) = \alpha u'(x)(u(x))^n$  حيث  $\alpha$  و  $n$  معلومين)

حدد دوال أصلية للدالة  $f$  على  $\mathbb{R}$   $f(x) = \frac{3}{4x^2 + 4x + 2}$  -2

(باستعمال الشكل القانوني نحصل على  $f(x) = \alpha \frac{u'(x)}{(u(x))^2 + 1}$ )

حدد دوال أصلية للدالة  $f$  على  $\mathbb{R}$   $f(x) = \cos^3 x$  -3

(يتم اخطاط  $f(x)$  بوضع  $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ )

### IV- تطبيقات الاشتقاق - دراسة الدوال

#### A - الأنشطة

##### تمرين 1

1- حدد رتبة الدالة  $f$  و مطايرفها النسبية أو المطلقة إن وجدت في الحالتين التاليتين.

أ-  $f(x) = x(x-3)^2$  ب-  $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x}$

2- حدد عدد جذور المعادلة  $x^3 + 2x^2 - 7x + 1 = 0$

##### تمرين 2

أدرس تقعر  $C_f$  منحنى الدالة و حدد نقط انعطافه في الحالتين التاليتين (إن كان ممكنا).

أ-  $f(x) = x^4 - 2x^3 - 13x$  ب-  $f(x) = \cos x - \sin x$

ج-  $f(x) = x|x|$  ( لاحظ أن  $f$  غير قابلة للاشتقاق مرتين في 0 و مع ذلك تقبل نقطة انعطاف في  $O(0;0)$  )

### تمرين 3

- حدد المقاربات إن وجدت  
- أعط الاتجاهات المقاربة في الحالات التالية

أ-  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{-2x^2 + x + 3}$     ب-  $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$     ج-  $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x-1}$     د-  $f(x) = x + \sqrt{x}$

ر-  $f(x) = x + \sin 2\pi x$



### تمرين 4

- 1- نعتبر  $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 3$  بين ان  $A(1;2)$  مركز تماثل للمنحنى  $C_f$
- 2- نعتبر  $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$
- بين ان المستقيم الذي معادلته  $x = \frac{5}{2}$  محور تماثل للمنحنى  $C_f$

### B- تذكير مع بعض الاضافات


#### 1-1-1 تعريف

لتكن  $f$  قابلة للاشتقاق على مجال  $I$   
نقول إن المنحنى  $(C_f)$  محدب إذا كان يوجد فوق جميع مماساته  
نقول إن المنحنى  $(C_f)$  مقعر إذا كان يوجد تحت جميع مماساته



### 2-1-1 خاصيات

- \* إذا كانت  $f$  موجبة على  $I$  فان  $(C_f)$  يكون محدبا على  $I$
- \* إذا كانت  $f$  سالبة على  $I$  فان  $(C_f)$  يكون مقعرا على  $I$
- \* إذا كانت  $f$  تنعدم في  $x_0$  من المجال  $I$  وكان يوجد  $\alpha \in \mathbb{R}_+$  بحيث إشارة  $f$  على  $[a; a+\alpha[$  مخالفة لإشارة  $f$  على  $]a-\alpha; a]$  فان  $A(a; f(a))$  نقطة انعطاف للمنحنى  $(C_f)$



**ملاحظة** قد لا تكون الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق مرتين ويكون مع ذلك لمبيانها نقطة انعطاف

### 2 الفروع اللانهائية

#### 1-2 تعريف


إذا آلت إحدى إحداثيتي نقطة من  $C$  منحنى دالة إلى اللانهاية فإننا نقول إن  $C$  يقبل فرعا لانهائيا.

### 2-2 مستقيم مقارب لمنحنى




## -a مقارب عمودي

إذا كان  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$  أو  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$  فإن المستقيم الذي معادلته  $x = a$  مقارب لـ  $(C_f)$



## -b مقارب أفقي

إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$  فإن المستقيم الذي معادلته  $y = b$  مقارب لـ  $(C_f)$



## -c مقارب عمودي


يكون المستقيم الذي معادلته  $y = ax + b$  مقارب للمنحنى  $(C_f)$  إذا وفقط إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$

### خاصة

يكون المستقيم الذي معادلته  $y = ax + b$  مقارب للمنحنى  $(C_f)$  إذا وفقط إذا كان

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - ax) = b ; \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = a \quad \text{أو} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = b ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$$

**ملاحظة** دراسة إشارة  $f(x) - (ax + b)$  تمكننا من معرفة وضع المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة للمقارب المائل.



## 2-3- الاتجاهات المقاربة

### تعريف

أ - إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$  نقول إن  $(C_f)$  يقبل محور الأرتاب كاتجاه مقارب.

ب - إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$  نقول إن  $(C_f)$  يقبل محور الافاصل كاتجاه مقارب.

ج - إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$  و  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - ax = \pm\infty$  نقول إن  $(C_f)$  يقبل المستقيم ذا المعادلة  $y = ax$  كاتجاه مقارب

### 3 - مركز تماثل - محور تماثل

#### 3-1 خاصة

في معلم متعامد , يكون المستقيم الذي معادلته  $x = a$  محور تماثل لمنحنى دالة  $f$  إذا وفقط إذا كان  $\forall x \in D_f \quad f(2a - x) = f(x)$

#### 3-2 خاصة

في معلم متعامد, تكون النقطة  $E(a; b)$  مركز تماثل لدالة  $f$  إذا وفقط إذا كان  $\forall x \in D_f \quad f(2a - x) = 2b - f(x)$

### 4- الدالة الدورية

#### 4-1 تعريف


نقول أن  $f$  دالة دورية إذا وجد عدد حقيقي  $T$  موجب قطعاً ب حيث  $\forall x \in D_f \quad x+T \in D_f; \quad x-T \in D_f \quad f(x+T) = f(x)$  العدد  $T$  يسمى دور الدالة  $f$ . اصغر دور موجب قطعاً يسمى دور الدالة  $f$

#### 4-2 خاصة

إذا كانت للدالة  $f$  دور  $T$  فإن  $\forall x \in D_f, \forall n \in \mathbb{Z} \quad f(x+nT) = f(x)$

#### 4-3 خاصة

إذا كانت  $f$  دالة دورية و  $T$  دوراً لها فإن منحنى الدالة  $f$  على  $[a+nT; a+(n+1)T[$  هو صورة منحنى الدالة على  $[a, a+T[$  بواسطة الإزاحة ذات المتجهة  $nT \cdot \vec{i}$  حيث  $n$  عدد صحيح نسبي.



### C- دراسة الدوال

تصميم دراسة دالة

لدراسة دالة  $f$  في غالب الأحيان نتبع الخطوات التالية

- تحديد مجموعة التعريف ثم تحديد مجموعة الدراسة (خاصة إذا كانت  $f$  زوجية أو فردية أو دورية)
- دراسة الاتصال و الاشتقاق و تحديد الدالة الاشتقاق و دراسة إشارتها بالإضافة إلى التأويلات الهندسية
- وضع جدول التغيرات
- دراسة الفروع الانتهائية و تحديد المقاربات
- دراسة التقعر إن كان ذلك ضرورياً و تحديد نقط انعطاف إن وجدت
- إنشاء المنحنى