

### تصحيح التمرين الأول

.أ.1 (  $x = 0$  ) يقبل مقاربا عموديا معادلته  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ x > 0}} f(x) = +\infty$

(  $x = 0$  ) يقبل مقاربا عموديا معادلته  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0^- \\ x < 0}} f(x) = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

(  $C_f$  ) يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار  $-\infty$   $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

(  $y = -x$  ) يقبل مقاربا مائلا معادلته  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x) = 0$

ب. جدول تغيرات  $f$ :

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	
$f(x)$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$

ج. على المجال  $[0, +\infty]$  لدينا ( $C_f$ ) يوجد فوق المستقيم  $y = -x$

إذن  $f(x) + x \geq 0$  و منه  $f(x) - (-x) \geq 0$

د. عدد حلول المعادلة  $f(x) = -x$  على  $\mathbb{R}^*$

لدينا ( $C_f$ ) و ( $\Delta$ ):  $y = -x$  يتقاطعان في نقطة وحيدة و منه للمعادلة  $f(x) = -x$ : حل واحدا في

2. مساحة الحيز المخدش في المبيان هي مساحة الحيز المحصور بين ( $C_f$ ) و المستقيم  $x = -y$ : ( $\Delta$ ) و المستقيمين اللذين معادلاتها

$$: x = 2 \text{ و } x = 1$$

$$A = \int_1^2 |f(x) - (-x)| dx .(U.A)$$

و بما أن  $f(x) + x \geq 0$  على المجال  $[0, +\infty]$

$$A = \int_1^2 (f(x) + x) dx .(U.A)$$

$$\text{إذن : } A = \int_1^2 \left( e^{-x} + \frac{1}{x} \right) dx .(U.A)$$

$$\text{إذن : } A = \left[ -e^{-x} + \ln x \right]_1^2 .(U.A)$$

$$\text{و منه : } A = (e^{-1} - e^{-2} + \ln 2) .(U.A)$$

## تصحيح التمرين الثاني

### الجزء الأول :

(1) الدالة  $g$  قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  :  $x \in \mathbb{R}$  ليكن

$$\begin{aligned} g'(x) &= (-xe^{-x} + 1)' \\ &= (-x)'e^{-x} + (-x)(e^{-x})' + 0 \\ &= -e^{-x} - x \cdot (-e^{-x}) \\ &= -e^{-x} + xe^{-x} \\ &= (x-1)e^{-x} \end{aligned}$$

لدينا :  $x-1 > 0$  إذن إشارة  $g'(x)$  هي إشارة  $e^{-x}$

$x$	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$	-	0	+

جدول تغيرات الدالة  $g$  :

$x$	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$	$(e-1)/e$	1

(2) لدينا (1)  $g$  هي القيمة الدنيا للدالة  $g$  على  $\mathbb{R}$

إذن لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  :  $g(x) \geq g(1)$

إذن لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  :  $g(x) \geq \frac{e-1}{e}$

ومنه لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  :  $g(x) > 0$  لأن  $\frac{e-1}{e} > 0$

### الجزء الثاني :

أ- لدينا :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 1 + (x+1)e^{-x} = -\infty$  (1)

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 1 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x + 1 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \end{array} \right. \text{ لأن :}$$

بـ لدينا :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 + (x+1)e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 + xe^{-x} + e^{-x} = +\infty$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} -te^t = 0 & \left( \begin{array}{l} t = -x \\ x \rightarrow +\infty \\ t \rightarrow -\infty \end{array} \right) \text{ لأن} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0 \end{cases}$$

أـ لدينا :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x-1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} + e^{-x} = 0 \quad (2)$

إذن :  $(\Delta)$  ذي المعادلة  $y = x - 1$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ .

بـ لدينا :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 1 + (x+1)e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \frac{1}{x} + \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{-x} = +\infty \quad \text{و}$$

إذن  $(C_f)$  يقبل فرعاً شلجمياً في اتجاه محور الأراتيب بجوار  $-\infty$ .

ليكن  $x \in \mathbb{R}$  :

$$f(x) - (x-1) = (x+1)e^{-x}$$

لدينا :  $e^{-x} > 0$  إذن إشارة  $f(x) - (x-1)$  هي إشارة  $(x+1)$

$\checkmark$  على المجال  $[x+1, +\infty)$  إذن  $f(x) - (x-1) \geq 0$  و منه  $f(x) - (x-1) \geq 0$  :

$\checkmark$  على المجال  $[-\infty, x+1]$  إذن  $f(x) - (x-1) \leq 0$  و منه  $f(x) - (x-1) \leq 0$  :

أـ الدالة  $f$  قابلة للاشتاقاق على  $\mathbb{R}$

ليكن  $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-1+(x+1)e^{-x})' \\ &= 1+(x+1)'e^{-x} + (x+1).(e^{-x})' \\ &= 1+1.e^{-x} - (x+1).e^{-x} \\ &= 1+e^{-x}.(1-x-1) \\ &= 1-xe^{-x} \\ &= g(x) \end{aligned}$$

إذن :  $f'(x) = g(x)$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

بـ لدينا حسب الجزء الأول :  $g(x) > 0$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

إذن :  $f'(x) > 0$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

و منه  $f$  تزايدية قطعاً على  $\mathbb{R}$

جدول تغيرات الدالة  $f$  :

$x$	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

(5)

ل يكن  $x \in \mathbb{R}$

لدينا  $f''(x) = g'(x)$  إذن  $f'(x) = g(x)$

و منه على المجال  $[1, +\infty]$  إذن  $(C_f)$  محدب

و على المجال  $[-\infty, 1]$  إذن  $(C_f)$  مقعر


و بما أن  $f''$  تتعدم و تغير إشارتها عند العدد 1 فإن النقطة  $I(1, f(1))$  هي نقطة انعطاف لمنحنى  $(C_f)$ .

(6) أ- معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  في النقطة التي أقصولها 0 :

$$y = f'(0) \cdot (x - 0) + f(0)$$

$$\text{إذن : } y = x \quad \text{أي} \quad y = 1 \cdot (x) + 0$$

- ب-



(7) أ- باستعمال متكاملة بالأجزاء ، لنحسب  $\int_0^2 (x+1)e^{-x} dx$

$$\begin{cases} u(x) = x+1 \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases} \leftarrow \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases} \not\leftarrow$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 (x+1)e^{-x} dx &= \left[ -(x+1)e^{-x} \right]_0^2 - \int_0^2 -e^{-x} dx \\ &= \left[ -(x+1)e^{-x} \right]_0^2 - \left[ e^{-x} \right]_0^2 \\ &= (-3e^{-2} + 1) - (e^{-2} - 1) \\ &= 2 - 4e^{-2} \end{aligned}$$

ب- مساحة الحيز المحصور بين  $(C_f)$  و المستقيمات اللذين معادلاتهن :  $y = x - 1$  و  $x = 0$  و  $x = 2$   
( على المجال  $[0, 2]$  :

$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 |f(x) - (x-1)| dx .(UA) \\ &= \int_0^2 (f(x) - (x-1)) dx .(UA) \\ &= \int_0^2 (x+1)e^{-x} dx .(UA) \\ &= (2 - 4e^{-2}) .(UA) \end{aligned}$$

الجزء الثالث :

(1)

✓ من أجل  $n = 0$  :

$$u_0 = 1$$

$$0 \leq u_0 \leq 1$$

✓ ليكن  $n \in \mathbb{N}$

• نفترض أن  $0 \leq u_n \leq 1$  :

• و نبين أن  $0 \leq u_{n+1} \leq 1$  :

لدينا  $0 \leq u_n \leq 1$  ولدينا  $f$  تزايدية على المجال  $[0, 1]$

$$f(0) \leq f(u_n) \leq f(1)$$

$$\text{إذن: } 0 \leq u_{n+1} \leq 2e^{-1} \leq 1$$

✓ نستنتج : لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$   $0 \leq u_n \leq 1$

✓ ليكن  $n \in \mathbb{N}$  لدينا على المجال  $[0, 1]$

$$f(x) \leq x : [0, 1]$$

و بما أن  $f(u_n) \leq u_n$  فإن  $u_n \in [0,1]$   
و منه لكل  $n$  من  $N$  :  
و بالتالي  $(u_n)$  تناقصية .

(3)

✓ بما أن  $(u_n)$  تناقصية و مصغورة فإن  $(u_n)$  متقاربة

✓

$f$  متصلة على المجال  $[0,1]$  •

$$f([0,1]) = [f(0), f(1)] = [0, 2e^{-1}] \subset [0,1] \quad •$$

$(u_n)$  متقاربة •

إذن نهاية  $(u_n)$  هي حل للمعادلة

$$f(x) = x \Leftrightarrow x = 0$$

و منه :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

### تصحيح التمرين الثالث

(1)

$$\begin{aligned} D_f &= \{x \in \mathbb{R} / e^x - 1 \neq 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / e^x \neq 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\} \\ &= ]-\infty, 0[ \cup ]0, +\infty[ \end{aligned}$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + \frac{e^x}{e^x - 1} = -\infty \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{cases} : \text{ لأن}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} 2x + \frac{e^x}{e^x - 1} = -\infty \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x - 1 = 0^- \end{cases} : \text{ لأن}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x + \frac{e^x}{e^x - 1} = +\infty \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x - 1 = 0^+ \end{cases} : \text{ لأن}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + \frac{e^x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + \frac{e^x}{e^x \left(1 - \frac{1}{e^x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + \frac{1}{1 - \frac{1}{e^x}} = +\infty \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{cases} : \text{ لأن}$$

(3)  $f$  لندرس تغيرات

الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق على

:  $x \in D_f$  ليكن

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left( 2x + \frac{e^x}{e^x - 1} \right)' \\
 &= 2 + \frac{(e^x)'(e^x - 1) - e^x(e^x - 1)'}{(e^x - 1)^2} \\
 &= 2 + \frac{e^x(e^x - 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x - 1)^2} \\
 &= 2 + \frac{e^{2x} - e^x - e^{2x}}{(e^x - 1)^2} \\
 &= \frac{2(e^x - 1)^2 - e^x}{(e^x - 1)^2} \\
 &= \frac{2(e^{2x} - 2e^x + 1) - e^x}{(e^x - 1)^2} \\
 &= \frac{2e^{2x} - 5e^x + 2}{(e^x - 1)^2}
 \end{aligned}$$

لدينا :  $2e^{2x} - 5e^x + 2 > 0$  إذن إشارة  $f'(x)$  هي إشارة  $(e^x - 1)^2$

$x$	$-\infty$	$-\ln 2$	$0$	$\ln 2$	$+\infty$
$2e^{2x} - 5e^x + 2$	+	0	-	-	0

جدول تغيرات  $f$

$x$	$-\infty$	$-\ln 2$	$0$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	-	0
$f(x)$	$-\infty$	$-2\ln(2)-1$	$+\infty$	$2\ln(2)+2$	$+\infty$

(4)

$$x = 0 \text{ يقبل مقاربا عموديا معادلة } C_f \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = -\infty \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty \end{cases} \quad \checkmark$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} = 0 \quad \checkmark$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \checkmark$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} : \text{لحسب}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \frac{e^x}{e^x - 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \frac{e^x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{x \left(1 - \frac{1}{e^x}\right)} = 2$$

$$: \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x : \text{لحسب}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{e^x}} = 1$$

+∞ بجوار  $y = 2x + 1$  يقبل مقارباً مائلاً معادلته  $\boxed{C_f}$  إذن :

$$x \in D_f = ]-\infty, 0[ \cup ]0, +\infty[ \quad (5)$$

من الواضح أن  $2(0) - x = -x \in D_f = ]-\infty, 0[ \cup ]0, +\infty[$  ✓


$$f(2(0) - x) = f(-x) = -2x + \frac{e^{-x}}{e^{-x} - 1} = -2x + \frac{1}{1 - \frac{1}{e^{-x}}} = -2x + \frac{1}{1 - e^x} \quad \checkmark$$

$$2\left(\frac{1}{2}\right) - f(x) = 1 - \left(2x + \frac{e^x}{e^x - 1}\right) = -2x + 1 - \frac{e^x}{e^x - 1} = -2x + \frac{e^x - 1 - e^x}{e^x - 1} = -2x + \frac{1}{1 - e^x}$$

$$f(2(0) - x) = 2\left(\frac{1}{2}\right) - f(x) : \text{إذن :}$$

.  $\boxed{C_f}$  مركز تمايز للمنحنى  $A\left(0, \frac{1}{2}\right)$  و منه النقطة

(6)



7) مساحة الحيز المحصور بين  $(C_f)$  ذي المعادلة  $y = 2x$  و المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $x = 1$  و  $x = \ln 2$

$$A = \int_{\ln 2}^1 |f(x) - 2x| dx .(UA)$$

$$= \int_{\ln 2}^1 \frac{e^x}{e^x - 1} dx .(UA)$$

$$= \int_{\ln 2}^1 \frac{(e^x - 1)'}{e^x - 1} dx .(UA)$$

$$= \left[ \ln |e^x - 1| \right]_{\ln 2}^1 .(UA)$$

و منه :  $A = \ln(e - 1) \cdot (UA)$

تصحيح التمرين الرابع :

الجزء الأول  
(1)

ليكن  $x \in [0, +\infty[$  •

$$g'(x) = (x + 2 - e^x)' = 1 - e^x$$

لدينا :  $e^x \geq e^0$  إذن  $x \geq 0$   
 $e^x \geq 1$  إذن  
 $-e^x \leq -1$  إذن  
 $1 - e^x \leq 0$  إذن

$\forall x \in [0, +\infty[ \quad g'(x) \leq 0$

و لدينا :  $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

و بالتالي الدالة  $g$  تنقصصية قطعا على  $[0, +\infty[$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 2 - e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{e^x}{x}\right) = -\infty \quad •$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \quad : \text{ لأن} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \end{cases}$$

(2) أ- لنبين أن المعادلة  $0 = g(x)$  تقبل حلًا وحيدًا  $\alpha$  في المجال  $[0, +\infty[$

بما أن :

✓ الدالة  $g$  متصلة على  $[0, +\infty[$  (مجموع دوال متصلة على  $[0, +\infty[$ )

✓ الدالة  $g$  تنقصصية قطعا على  $[0, +\infty[$

$0 \in g([0, +\infty[)$  إذن  $g([0, +\infty[) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x), g(0) = ]-\infty, 1]$  ✓

فإن المعادلة  $0 = g(x)$  تقبل حلًا وحيدًا  $\alpha$  في المجال  $[0, +\infty[$

ب- لدينا :

$[1,14; 1,15] \quad g$  ✓

$$\frac{g(1,14) \times g(1,15) < 0}{\text{إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطية : } 1,14 < \alpha < 1,15} \quad \checkmark$$

ج

الحالة 1: إذا كان  $x \geq \alpha$   $\checkmark$

نعلم أن  $g$  تناقصية قطعاً على  $[0, +\infty]$

إذن  $g(x) \leq g(\alpha)$

و منه  $(g(\alpha) = 0 \quad g(x) \leq 0)$

الحالة 2: إذا كان  $0 \leq x \leq \alpha$   $\checkmark$

نعلم أن  $g$  تناقصية قطعاً على  $[0, +\infty]$

إذن  $g(x) \geq g(\alpha)$

و منه  $(g(\alpha) = 0 \quad g(x) \geq 0)$

## الجزء الثاني

:  $x \in [0, +\infty]$  أ- ليكن

الدالة  $f$  قابلة للاشتقاق على  $[0, +\infty]$

$f'(x) = \left( \frac{e^x - 1}{xe^x + 1} \right)' = \frac{(e^x - 1)'(xe^x + 1) - (e^x - 1)(xe^x + 1)'}{(xe^x + 1)^2}$  لدينا :

$f'(x) = \frac{e^x \cdot (xe^x + 1) - (e^x - 1)((x)e^x + x(e^x)') + 0}{(xe^x + 1)^2}$  إذن :

$f'(x) = \frac{e^x \cdot (xe^x + 1) - (e^x - 1)(e^x + xe^x)}{(xe^x + 1)^2} = \frac{e^x \cdot (xe^x + 1) - (e^x - 1)(1+x)e^x}{(xe^x + 1)^2}$  إذن :

$f'(x) = \frac{e^x \cdot [(xe^x + 1) - (e^x - 1)(1+x)]}{(xe^x + 1)^2} = \frac{e^x [xe^x + 1 - e^x - xe^x + 1 + x]}{(xe^x + 1)^2}$  إذن :

$f'(x) = \frac{e^x [x + 2 - e^x]}{(xe^x + 1)^2}$  إذن :

$f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(xe^x + 1)^2} : [0, +\infty]$  و منه: لكل  $x$  من

ب- على المجال  $[0, \alpha]$

لدينا :  $(xe^x + 1)^2 > 0$  و  $e^x > 0$

و حسب نتيجة الجزء الأول للسؤال ج- :

إذن  $0 \leq f'(x)$  و منه الدالة  $f$  تزايدية

على المجال  $[\alpha, +\infty[$

لدينا :  $(xe^x + 1)^2 > 0$  و  $e^x > 0$

و حسب نتيجة الجزء الأول للسؤال ج- :

إذن  $0 \leq f'(x)$  و منه الدالة  $f$  تنقصصية

أ- ليكن  $x \in [0, +\infty[$  (2)

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{xe^x + 1} = \frac{e^x \left(1 - \frac{1}{e^x}\right)}{e^x \left(x + \frac{1}{e^x}\right)} = \frac{1 - e^{-x}}{x + e^{-x}} \quad \text{لدينا :}$$

إذن : لكل  $x \geq 0$   $f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x + e^{-x}}$

-ب-

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-x}}{x + e^{-x}} = 0 \quad \text{لدينا : •}$$

$$\begin{cases} t = -x \\ x \rightarrow +\infty \\ t \rightarrow -\infty \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0 : \text{ لأن :}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + e^{-x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x + e^{-x} = +\infty \end{cases}$$

بما أن :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  فإن  $(C_f)$  يقبل مقاربًا أفقيًّا معادله  $y = 0$  بجوار  $+\infty$  •

$$f(\alpha) = \frac{e^\alpha - 1}{\alpha e^\alpha + 1} \quad \text{أ- لدينا : (3)}$$

ونعلم أن  $\alpha$  حل للمعادلة  $g(x) = 0$  إذن :  $g(\alpha) = 0$

$$\begin{aligned} g(\alpha) = 0 &\Leftrightarrow \alpha + 2 - e^\alpha = 0 \\ &\Leftrightarrow e^\alpha = \alpha + 2 \end{aligned} \quad \text{إذن لدينا :}$$

$$f(\alpha) = \frac{e^\alpha - 1}{\alpha e^\alpha + 1} = \frac{(\alpha + 2) - 1}{\alpha(\alpha + 2) + 1} = \frac{\alpha + 1}{\alpha^2 + 2\alpha + 1} = \frac{\alpha + 1}{(\alpha + 1)^2} = \frac{1}{\alpha + 1} \quad \text{و منه :}$$

و بالتالي :  $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha+1}$

بـ لدينا :  $1,14 < \alpha < 2,15$  إذن :  $2,14 < 1+\alpha < 2,15$

$$\frac{1}{2,15} < \frac{1}{1+\alpha} < \frac{1}{2,14} \text{ إذن}$$

$$0,46 < \frac{1}{2,15} < \frac{1}{1+\alpha} < \frac{1}{2,14} < 0,47 \text{ إذن :}$$

و منه :  $0,47 - 0,46 = 0,01 = 10^{-2}$  وهذا تأثير للعدد  $f(\alpha) < 0,47$

(4) معادلة المماس ( $T$ ) للمنحنى ( $C_f$ ) في النقطة ذات الأصول 0 :

$$y = f'(0) \cdot (x - 0) + f(0)$$

لدينا :  $y = x$  أي  $y = 1 \cdot (x - 0) + 0$  إذن  $f(0) = 0$  و

أـ ل يكن  $x$  من  $[0, +\infty[$  (5)

$$\begin{aligned} f(x) - x &= \frac{e^x - 1}{xe^x + 1} - x \\ &= \frac{e^x - 1 - xe^x - x}{xe^x + 1} \\ &= \frac{(1-x^2)e^x - (1+x)}{xe^x + 1} \\ &= \frac{(1+x)(1-x)e^x - (1+x)}{xe^x + 1} \\ &= \frac{(1+x)[(1-x)e^x - 1]}{xe^x + 1} \\ &= \frac{(1+x)(e^x - xe^x - 1)}{xe^x + 1} \end{aligned}$$

إذن : لكل  $x$  من  $[0, +\infty[$  حيث  $f(x) - x = \frac{(x+1)u(x)}{xe^x + 1}$

بـ اندرس تغيرات الدالة  $u$  ل يكن  $x$  من  $[0, +\infty[$

$$\begin{aligned} u'(x) &= (e^x - xe^x - 1)' \\ &= (e^x)' - (xe^x)' + 0 \\ &= e^x - ((x)'e^x + x(e^x)') \\ &= e^x - (e^x + xe^x) \\ &= e^x - e^x - xe^x \\ &= -xe^x \end{aligned}$$

لدينا :  $x \geq 0$  و  $e^x > 0$  إذن :  $u'(x) \leq 0$  لكل  $x$  من  $[0, +\infty)$   
إذن الدالة  $u$  تنقصصية .  
و بما أن  $u(0)=0$  و  $u(x) \leq 0$  أي :  $u(x) \leq u(0)$  لأن  $0 \leq x$  و  $u$  تنقصصية فإن :  
ج - ليكن  $x$  من  $[0, +\infty)$  لندرس الوضع النسبي ل  $(C_f)$  و  $(T)$   
لدينا :  $f(x)-x = \frac{(x+1)u(x)}{xe^x+1}$   
ولدينا  $x \geq 0$  إذن  $xe^x+1 > 0$  و منه إشارة  $f(x)-x$  هي إشارة  $u(x)$  و منه  $f(x)-x \leq 0$  و حسب نتائج سؤال سابق لدينا :  
و بالتالي :  $(T)$  يوجد تحت المستقيم  $(C_f)$

(6)



### الجزء الثالث

(1) لنحدد دالة أصلية ل  $f$  على  $[0, +\infty)$   
الدالة  $f$  متصلة على  $[0, +\infty)$  إذن  $f$  تقبل دالة أصلية  $F$  على  $[0, +\infty)$   
ليكن  $x$  من  $[0, +\infty)$  لدينا حسب نتائج سؤال (2) في الجزء الثاني :  
$$f(x) = \frac{1-e^{-x}}{x+e^{-x}}$$
  
إذن : 
$$f(x) = \frac{(x+e^{-x})'}{x+e^{-x}}$$
  
( لأن  $x+e^{-x} > 0$  )  $F(x) = \ln|x+e^{-x}| = \ln(x+e^{-x})$  :  $[0, +\infty)$   
و منه لكل  $x$  من  $[0, +\infty)$  لدينا :  
$$\mathcal{A} = \int_0^1 |f(x)-x| dx \times \|i\| \times \|j\|$$
  
وبما أن  $0 \leq x \leq 1$  لدينا  $|f(x)-x| = f(x)-x$

(2)

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - f(x)) dx \times 4\text{cm} \times 4\text{cm} : \text{فإن}$$

$$\mathcal{A} = \left[ \frac{x^2}{2} - F(x) \right]_0^1 \times 16\text{cm}^2 : \text{إذن}$$

$$\mathcal{A} = \left[ \frac{x^2}{2} - \ln(x + e^{-x}) \right]_0^1 \times 16\text{cm}^2 : \text{إذن}$$

$$\mathcal{A} = \left( \frac{1}{2} - \ln(1+e^{-1}) \right) \times 16\text{cm}^2 : \text{إذن}$$

$$\mathcal{A} = (8 - 16\ln(1+e^{-1}))\text{cm}^2 : \text{و منه}$$

$$v_n = \int_n^{n+1} f(x) dx \quad \text{أ- لدينا لكل } n \text{ من } N \text{ ، نضع} \quad (3)$$

$$v_0 = \int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = [\ln(x + e^{-x})]_0^1 = \ln(1+e^{-1})$$

$$v_1 = \int_1^2 f(x) dx = [F(x)]_1^2 = [\ln(x + e^{-x})]_1^2 = \ln(2+e^{-2}) - \ln(1+e^{-1})$$

$$v_2 = \int_2^3 f(x) dx = [F(x)]_2^3 = [\ln(x + e^{-x})]_2^3 = \ln(3+e^{-3}) - \ln(2+e^{-2})$$

$$\text{ب- لنبين أن لكل } n \geq 2 \text{ : } f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$$

• ليكن  $x \in \mathbb{R}$  بحيث :  $n \leq x \leq n+1$  و لدينا  $f$  تناقصية على المجال  $[2, +\infty]$

$$f(n+1) \leq f(x) \leq f(n) : \text{إذن}$$

$$\int_n^{n+1} f(n+1) dx \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \int_n^{n+1} f(n) dx : \text{إذن}$$

$$(n+1-n)f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq (n+1-n)f(n) : \text{إذن}$$

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n) : \text{و منه}$$

• نستنتج مما سبق أن  $f(n+1) \leq v_n \leq f(n)$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = 0 \text{ و } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(n+1) = 0 : \text{و بما أن}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 : \text{فإنـه حسب مبرهنة الدرـك}$$

### تصحيح التمرين الخامس

I

(1)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - 2x + 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \frac{e^x}{x} - 2 + \frac{2}{x} \right) = +\infty \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{لأن:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x - 2x + 2 = +\infty \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x + 2 = +\infty \end{cases} \quad \text{لأن:}$$

أ- الدالة  $g$  قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$

:  $x \in \mathbb{R}$

$$g'(x) = (e^x - 2x + 2)' = e^x - 2$$

إذن لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$  :

-

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \ln 2$$

لدرس إشارة  $e^x - 2$

$x$	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$e^x - 2$	-	0	+

جدول تغيرات الدالة :  $g$

$x$	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$	$4 - 2\ln 2$	$+\infty$

✓ لدينا  $g(\ln 2)$  هي القيمة الدنيا للدالة  $g$  على  $\mathbb{R}$

إذن :  $g(x) \geq g(\ln 2)$

إذن :  $\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) \geq 4 - 2\ln 2 > 0$

و منه  $\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) > 0$

-أ- (1) II

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2}x + 1 + xe^{-x} = -\infty \quad \checkmark$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2}x + 1 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty \end{array} \right. : \text{لأن}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} + \frac{1}{x} + e^{-x} = +\infty \quad \checkmark$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \end{array} \right. : \text{لأن}$$

( $C_f$ ) يقبل فرعاً شلجمياً في اتجاه محور الأراتيب بجوار  $-\infty$   $\checkmark$

-ب-

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}x + 1 + xe^{-x} = +\infty \quad \checkmark$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}x + 1 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} -te^t = 0 \end{array} \right. : \text{لأن}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \left( \frac{1}{2}x + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0 \quad : \text{لدينا} \quad \checkmark$$

إذن : ( $C_f$ ) يقبل المستقيم ( $D$ ) مقارباً مائلاً معادلته  $y = \frac{1}{2}x + 1$  بجوار  $+\infty$

ج- لندرس الوضع النسبي للمنحنى ( $C_f$ ) و المستقيم ( $D$ ) :

ليكن  $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) - \left( \frac{1}{2}x + 1 \right) = xe^{-x} \quad \text{لدينا}$$

$f(x) - \left( \frac{1}{2}x + 1 \right) \leq 0 \quad \text{إذن} \quad x \leq 0 \quad : \text{لدينا} \quad \checkmark$

✓ على المجال  $[0, +\infty)$  لدينا  $x \geq 0$  إذن يوجد فوق  $(D_f)$  الدالة  $f$  قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left( \frac{1}{2}x + 1 + xe^{-x} \right)' \\ &= \frac{1}{2} + (x)'e^{-x} + x(e^{-x})' \\ &= \frac{1}{2} + e^{-x} - xe^{-x} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{e^x} - \frac{x}{e^x} \\ &= \frac{e^x + 2 - 2x}{2e^x} \\ &= \frac{g(x)}{2e^x} \end{aligned}$$

إذن :  $\mathbb{R} f'(x) = \frac{g(x)}{2e^x}$

لدينا :  $g(x) > 0$  و  $2e^x > 0$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

إذن  $f'(x) > 0$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}$

و منه الدالة  $f$  تزايدية قطعاً على  $\mathbb{R}$

- (3)

$f$  متصلة على  $[-1, 0]$  ✓

لدينا  $f(0) < 0$  و  $f(-1) > 0$  إذن  $f(0) = 1 > 0$   $f(-1) = \frac{1}{2} - e < 0$  ✓

إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطية : يوجد  $\alpha$  من المجال  $[-1, 0]$  بحيث  $f(\alpha) = 0$

بـ - معادلة  $(T)$  مماس المنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الأقصى 0 :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$y = \frac{3}{2}x + 1$$

ج- لِيَكُن  $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left( \frac{g(x)}{2e^x} \right)' \\
 &= \frac{g'(x) \times 2e^x - g(x) \times (2e^x)'}{(2e^x)^2} \\
 &= \frac{(e^x - 2) \times 2e^x - (e^x - 2x + 2) \times 2e^x}{(2e^x)^2} \\
 &= \frac{2e^x [e^x - 2 - e^x + 2x - 2]}{(2e^x)^2} \\
 &= \frac{2x - 4}{2e^x} \\
 &= \frac{x - 2}{e^x}
 \end{aligned}$$


إذن  $f''(x) = \frac{x-2}{e^x}$

لدينا  $e^x > 0$  إذن إشارة  $f''(x)$  هي إشارة 2

$x$	$-\infty$	2	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+

بما أن  $f''$  تتعدّم و تغيير إشارتها عند العدد 2 فإن النقطة  $I(2; 2 + 2e^{-2})$  هي نقطة انعطاف للمنحنى  $(C_f)$

(4)



:  $\int_0^2 xe^{-x} dx$  : 5) باستعمال متكاملة بالأجزاء لنحسب :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-x} \end{cases} \quad \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 xe^{-x} dx &= \left[ -xe^{-x} \right]_0^2 - \int_0^2 -e^{-x} dx \\ &= \left[ -xe^{-x} \right]_0^2 - \left[ e^{-x} \right]_0^2 \\ &= (-2e^{-2} - 0) - (e^{-2} - 1) \\ &= 1 - 3e^{-2} \\ &= 1 - \frac{3}{e^2} \end{aligned}$$

. 6) مساحة الحيز المحصور بين ( $C_f$ ) و محور الأفاسيل و المستقيمين المعرفين بالمعادلتين  $x = 0$  و  $x = 2$

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^2 |f(x)| dx \cdot \|\vec{i}\| \cdot \|\vec{j}\| \\
 &= \int_0^2 \left( \frac{1}{2}x + 1 + xe^{-x} \right) dx .2cm.2cm \\
 &= \left( \int_0^2 \left( \frac{1}{2}x + 1 \right) dx + \int_0^2 xe^{-x} dx \right) .4cm^2 \\
 &= \left( \left[ \frac{x^2}{4} + x \right]_0^2 + \left( 1 - \frac{3}{e^2} \right) \right) .4cm^2 \\
 &= \left( 3 + 1 - \frac{3}{e^2} \right) .4cm^2 \\
 &= \left( 16 - \frac{12}{e^2} \right) cm^2
 \end{aligned}$$

つづく