

إذن المجموعة (P) هي المستوى الذي معادلته:

$$2x + y - z + 2 = 0$$

تمرين 4: حدد متجهة منظمة على المستوى (P) في الحالات التالية:

$$(P) \quad 3x - z + 1 = 0 \quad (2) \quad (P) \quad 2x - 3y + z + 10 = 0 \quad (1)$$

$$(P) \quad z = 2 \quad (4) \quad (P) \quad y + z + 1 = 0 \quad (3)$$

$$(P) : 2y - z + 11 = 0 \quad (6) \quad (P) : x - 2y + 7z - 3 = 0 \quad (5)$$

أجوبة 1: $\vec{n}(2; -3; 1)$ (2) $\vec{n}(3; 0; -1)$ (3) $\vec{n}(0; 1; 1)$ (1)

أجوبة 2: $\vec{n}(0; 0; 1)$ (4) $\vec{n}(1; -2; 7)$ (5) $\vec{n}(0; 2; -1)$ (6)

تمرين 5: نعتبر في الفضاء المتجهة $\vec{n}(1; 2; 1)$ والنقطتين

$$A(-1; 0; 2) \text{ و } B(3; 1; 0)$$

(1) حدد معادلة ديكرتية للمستوى (P) المار من النقطة A و n متجهة منظمه عليه.

(2) حدد تمثيلا باراميتريا للمستقيم (D) المار من النقطة B و

العمودي على المستوى (P).

(3) حدد متلوث إحداثيات النقطة B' المسقط العمودي للنقطة B على المستوى (P).

أجوبة 1: تحديد معادلة ديكرتية للمستوى (P):

$$\text{طريقة 1: } M(x; y; z) \in (P) \text{ يعني } \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\overrightarrow{AM}(x+1; y; z-2) \text{ يعني}$$

$$(x+1) \times 1 + y \times 2 + 1 \times (z-2) = 0$$

$$\text{يعني } x+1+2y+z-2=0 \text{ يعني } x+2y+z-1=0 \text{ (P)}$$

طريقة 2: نعلم أن معادلة مستوى تكتب على الشكل:

$$ax + by + cz + d = 0$$

و نعلم أن $\vec{n}(1; 2; 1)$ متجهة منظمه عليه إذن:

$$a = 1 \text{ و } b = 1 \text{ و } c = 1$$

$$\text{ومنه: } (P) \quad 1x + 2y + 1z + d = 0$$

و نعلم أن: $A(-1; 0; 2) \in (P)$ إذن احداثيات A تحقق المعادلة:

$$\text{يعني } (-1) + 2 \times 0 + 1 \times 2 + d = 0 \text{ يعني } d = -1$$

$$\text{وبالتالي: } (P) \quad x + 2y + z - 1 = 0$$

(2) تحديد تمثيل باراميتري للمستقيم (D):

(D) يمر من النقطة B و عمودي على المستوى (P).

إذن: $\vec{n}(1; 2; 1)$ متجهة موجهة ل (D) و $B(3; 1; 0) \in (D)$

تمرين 1: ليكن $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ أساسا في الفضاء $\vec{u}(1; 5; -1)$ و

$$\vec{v}(-5; 1; 0) \text{ و } \vec{w} = \frac{1}{2}\vec{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{k}$$

(1) هل المتجهتان \vec{u} و \vec{v} متعامدتين؟

(2) أحسب: $\|\vec{w}\|$ و $\|\vec{u}\|$

الجواب 1: نحسب الجداء السلمي:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-5) \times 1 + 1 \times 5 + 0 \times (-1) = (-5) + 5 = 0$$

ومنه: $\vec{u} \perp \vec{v}$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(1)^2 + 5^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+25+1} = \sqrt{27} \quad (2)$$

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{4}{4}} = 1$$

تمرين 2: معلم متعامد منظم مباشر للفضاء

نعتبر النقط: $A(1; 0; -1)$ و $B(1; 2; -1)$ والمتجهات:

$$\vec{v}(2; 1; 0) \text{ , } \vec{u}(3; -2; 1)$$

(1) أحسب المسافة بين النقطتين A و B

(2) أحسب $\cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}})$

الجواب:

(1) المسافة بين النقطتين A و B هي:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

$$\text{أي: } AB = \sqrt{(0)^2 + (2)^2 + (0)^2} = 2$$

$$\cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} = \frac{4}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{14}} = \frac{4}{\sqrt{70}} \quad (2)$$

تمرين 3: نعتبر النقطة $A(1; -1; 2)$ و المتجهة $\vec{u}(2; 1; -1)$

حدد (P) مجموعة النقط M من الفضاء بحيث: $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = -1$

الجواب: لتكن $M(x; y; z)$ نقطة من الفضاء

$$\text{لدينا: } M(x; y; z) \in (P) \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = -1$$

$$\Leftrightarrow 2(x-1) + (y+1) - (z-2) = -1$$

هذه المعادلة تكتب على الشكل:

$$2x + y - z + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad ax + by + cz + d = 0$$

$$(D) : \begin{cases} x = -3t - 2 \\ y = 2t + 2 \\ z = t + 3 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{إذن :}$$

تمرين 9: حدد معادلة ديكارتية للفلكة (S) في الحالات التالية:

(1) (S) مركزها $\Omega(1; 2; -3)$ و شعاعها $R = 4$

(2) (S) مركزها $\Omega(0; -1; 1)$ و تمر من النقطة $A(1; 2; -1)$

أجوبة: (1) (S) مركزها $\Omega(1; 2; -3)$ و شعاعها $R = 4$

إذن : $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4^2$

يمكن الاكتفاء بهذه الكتابة أو نشرها فنجد :

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 + z^2 + 6z + 9 = 16$$

يعني : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 2 = 0$

وهي تكتب على الشكل التالي : $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

(2) (S) مركزها $\Omega(0; -1; 1)$ و تمر من النقطة $A(1; 2; -1)$

يعني : $\Omega A = R$

نحسب المسافة ΩA :

$$R = \Omega A = \sqrt{(1-0)^2 + (2+1)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{1+9+4} = \sqrt{14}$$

ومنه : معادلة ديكارتية للفلكة هي :

$$(x-0)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{14}^2$$

يعني : $(S) \quad x^2 + y^2 + z^2 + 2y - 2z - 12 = 0$

تمرين 10: حدد معادلة ديكارتية للفلكة (S) التي أحد أقطارها

$[AB]$ نضع : $A(1; 0; -1)$ و $B(1; 2; -1)$

الجواب: طريقة 1

مركزها Ω هو منتصف القطعة $[AB]$

إذن : $\Omega \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right)$ إذن : $\Omega(1; 1; -1)$


ولدينا أيضا : $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(0)^2 + (2)^2 + (0)^2}}{2} = 1$

ومنه : معادلة ديكارتية للفلكة هي :

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 1^2$$

يعني : $(S) \quad x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 2z + 2 = 0$

طريقة 2: نستعمل الخاصية :



$B(1; 2; -1)$

$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ يعني $M \in (S)$

لدينا $\overrightarrow{MA}(1-x; 0-y; -1-z)$ و

$\overrightarrow{MB}(1-x; 2-y; -1-z)$

يعني $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

$$(1-x) \times (1-x) + -y(2-y) + (-1-z)(-1-z) = 0$$

يعني $(1-x)^2 + -y(2-y) + (-1-z)^2 = 0$

$$\text{إذن :} \begin{cases} x = 1k + 3 \\ y = 2k + 1 \\ z = 1k + 0 \end{cases} \quad \text{حيث } k \in \mathbb{R} \text{ وهو تمثيل باراميتري للمستقيم}$$

(3) B' هي المسقط العمودي للنقطة B على المستوى (P) .

إذن : $B' \in (P)$ و $B' \in (D)$

$$\begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0 \\ x = 1k + 3 \\ y = 2k + 1 \\ z = 1k + 0 \end{cases} \quad \text{ومنه نحل النظام التالية :}$$

يعني $6k + 4 = 0$ يعني $k + 3 + 2(2k + 1) + k - 1 = 0$

$$\begin{cases} x = -\frac{2}{3} + 3 = \frac{7}{3} \\ y = -\frac{4}{3} + 1 = -\frac{1}{3} \\ z = -\frac{2}{3} + 0 \end{cases} \quad \text{يعني } k = -\frac{2}{3} \text{ ومنه :}$$

ومنه : $B' \left(\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{2}{3} \right)$

تمرين 6: حدد معادلة ديكارتية للمستوى (P) المحدد ب

$A(-5; 2; -1)$ و $\vec{n}(2; 1; -2)$ متجهة منظمية عليه

الجواب: نعتبر : $M(x; y; z) \in (P)$

$$M(x; y; z) \in (P) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

$$M(x; y; z) \in (P) \Leftrightarrow 2(x+5) + (y-2) - 2(z+1) = 0$$

$$M(x; y; z) \in (P) \Leftrightarrow 2x + y - 2z + 6 = 0$$

ومنه : $(P) : 2x + y - 2z + 6 = 0$

تمرين 7: نعتبر في الفضاء النقطة $A(5; 1; 0)$ و المستوى (P)

الذي معادلته $x + 2y + 2z - 6 = 0$

أحسب : $d(A; (P))$

الجواب: $d(A; (P)) = \frac{|5 + 2 \times 1 + 2 \times 0 - 6|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{|1|}{3} = \frac{1}{3}$

تمرين 8: $(P) : -3x + 2y + z + 2 = 0$

ليكن : $(D) \perp (P)$ و $B(-2; 2; 3) \in (D)$

(1) احسب : $d(B; (P))$ حدد تمثيلا باراميتريا ل (D)

أجوبة: (1) $d(B; (P)) = \frac{|-3 \times -2 + 2 \times 2 + 3 + 2|}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{15}{\sqrt{14}}$

(2) لدينا : $(P) : -3x + 2y + z + 2 = 0$

إذن : $\vec{n}(-3; 2; 1)$ متجهة منظمية على (P)

و بما أن : $(D) \perp (P)$ فإن :

$\vec{n}(-3; 2; 1)$ متجهة موجهة ل (D)

و لدينا : $B(-2; 2; 3) \in (D)$

2) نحل النظام التالية :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 4y - 2z + 5 = 0 \\ x = 2t \\ y = 5 + t; (t \in \mathbb{R}) \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

$$(2t)^2 + (5+t)^2 + (1-2t)^2 + 6 \times 2t - 4(5+t) - 2(1-2t) + 5 = 0$$

$$t^2 + 2t + 1 = 0 \text{ يعني } 9t^2 + 18t + 9 = 0$$

لدينا: $\Delta = 0$ اذن للمعادلة حل حقيقي مزدوج $t = \frac{-b}{2a} = -1$

نعوض $t = -1$ في التمثيل البارامترى ل (D)

$$\text{فنجد : } \begin{cases} x = -2 \\ y = 4; \\ z = 3 \end{cases} \text{ ومنه هناك نقطة وحيدة مشتركة بين (S) و (D)}$$

هي: $T(-2; 4; 3)$

في هذا المثال للفلكة (S) و المستقيم (D) نقطة وحيدة مشتركة هي

T

اذن المستقيم (D) مماس للفلكة (S) في النقطة T:

تمرين 13: لتكن (S) الفلكة التي معادلتها:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 1 = 0$$

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 2t; (t \in \mathbb{R}) \\ z = -1 + t \end{cases} \text{ و (D) المستقيم المعرف بما يلي:}$$

أدرس الوضع النسبي للمستقيم (D) و الفلكة (S)

الجواب :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 1 = 0 \\ x = -1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \text{ نحل النظام التالية :}$$

$$(-1+2t)^2 + (2-2t)^2 + (-1+t)^2 - 4 \times (-1+2t) - 2(2-2t) - 1 = 0$$

$$\Delta = 18^2 - 4 \times 9 \times 5 = 324 - 180 = 144 = 12^2 \text{ لدينا: } 9t^2 - 18t + 5 = 0$$

اذن المعادلة تقبل حلين حقيقيين مختلفين هما: $t_1 = \frac{1}{3}$ و $t_2 = \frac{5}{3}$

نعوض $t = \frac{1}{3}$ و $\frac{5}{3}$ في التمثيل البارامترى ل (D) فنجد نقطتين:

$$\text{هما : } A \left(-\frac{1}{3}; \frac{4}{3}; -\frac{2}{3} \right) \text{ و } B \begin{cases} x = \frac{7}{3} \\ y = -\frac{4}{3} \\ z = \frac{2}{3} \end{cases} \text{ و } A \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = \frac{4}{3} \\ z = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

في هذا المثال للفلكة (S) و المستقيم (D) لهما

نقطتان مشتركتان هما A و B نقول:

اذن المستقيم (D) قاطع للفلكة (S).

$$(S) \quad x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 2z + 2 = 0$$

تمرين 11: حدد مجموعة النقط $M(x; y; z)$ التي تحقق المعادلات التالية:

$$(E_1): x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 6z + 6 = 0 \quad (1)$$

$$(E_2): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 6 = 0 \quad (2)$$

$$(E_3): x^2 + y^2 + z^2 - x + 3y + 2z + \frac{9}{2} = 0 \quad (3)$$

أجوبة : (1) $(E_1): x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 6z + 6 = 0$

على الشكل : $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

اذن لدينا : $a = -6$ و $b = 4$ و $c = -6$ و $d = 6$

نحسب : $a^2 + b^2 + c^2 - 4d$

$$a^2 + b^2 + c^2 - 4d = 36 + 16 + 36 - 24 = 64 > 0$$

ومنه : (E_1) فلكة مركزها $\Omega\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; \frac{c}{2}\right)$ أي $\Omega(3; -2; 3)$

و شعاعها هو : $R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}}{2}$ أي $R = \frac{\sqrt{64}}{2} = \frac{8}{2} = 4$

$$(E_2): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 2z + 6 = 0 \quad (2)$$

على الشكل : $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

اذن لدينا : $a = -4$ و $b = 2$ و $c = 2$ و $d = 6$

نحسب : $a^2 + b^2 + c^2 - 4d$

$$a^2 + b^2 + c^2 - 4d = 16 + 4 + 4 - 24 = 0$$

ومنه : (E_2) هي النقطة $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)$ أي (E_2)

$$(E_2) = \left\{ \Omega(2; -1; -1) \right\}$$

$$(E_3): x^2 + y^2 + z^2 - x + 3y + 2z + \frac{9}{2} = 0 \quad (3)$$

على الشكل : $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

اذن لدينا : $a = -1$ و $b = 3$ و $c = 2$ و $d = \frac{9}{2}$

نحسب : $a^2 + b^2 + c^2 - 4d$

$$a^2 + b^2 + c^2 - 4d = 1 + 9 + 4 - 18 = -4 < 0$$

ومنه : (E_3) هي المجموعة الفارغة.

تمرين 12: لتكن (S) الفلكة التي معادلتها:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 4y - 2z + 5 = 0$$

و (D) المستقيم المار من $A(0; 5; 1)$ و $\vec{n}(2; 1; -2)$ متجهة موجهة له

(1) حدد تمثيل بارامترى للمستقيم (D)

(2) أدرس الوضع النسبي للمستقيم (D) و الفلكة (S)

الجواب (1): تمثيل بارامترى للمستقيم (D) هو :

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 5 + t; (t \in \mathbb{R}) \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

تمرين 14 لتكن (S) الفلكة التي معادلتها:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 2z + 4 = 0 \text{ والمستقيم } (D)$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t; (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$

أدرس الوضع النسبي للمستقيم (D) و الفلكة (S)

الجواب:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 2z + 4 = 0 \\ x = 0 \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

نحل النظام التالية :

$$0^2 + t^2 + t^2 - 2 \times 0 + 4t - 2t + 4 = 0$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 2 = -7 < 0 \text{ لدينا: } t^2 + t + 2 = 0 \text{ يعني } 2t^2 + 2t + 4 = 0$$

اذن المعادلة ليس لها حل في \mathbb{R}

ومنه المستقيم (D) يوجد خارج الفلكة (S) . يعني :

$$(S) \cap (D) = \emptyset$$

تمرين 15: تكن (S) الفلكة التي معادلتها:

$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

$$\vec{u}(-3; 2; 1) \text{ و } A(1; 1; -2)$$

ادرس تقاطع المستقيم (D) و (S)

الجواب: $M(x; y; z) \in (D) \cap (S)$

نبحث عن : تمثيل بارامتري ل (D) :

$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -2 + t \end{cases} \text{ يعني : } M(x; y; z) \in (S) \text{ و}$$

$$\text{اذن: } (1 - 3t)^2 + (1 + 2t)^2 + (-2 + t)^2 = 6$$

$$\text{يعني: } 14t^2 - 6t + 6 = 6 \text{ يعني: } 14t^2 - 6t = 0$$

$$\text{يعني: } t(7t - 3) = 0 \text{ يعني: } t = 0 \text{ أو } t = \frac{3}{7}$$

$$\text{ومنه: } M(1; 1; -2) ; M\left(\frac{-2}{7}; \frac{13}{7}; \frac{-13}{7}\right)$$

$$\text{اذن: } (D) \cap (S) = \left\{ A(1; 1; -2) ; B\left(\frac{-2}{7}; \frac{13}{7}; \frac{-13}{7}\right) \right\}$$

تمرين 16: لتكن (S) الفلكة التي معادلتها:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 2z - 1 = 0 \text{ والمستوى } (P)$$

$$\text{بالمعادلة: } 2x + y + 2z - 3 = 0$$

(1) حدد المركز Ω للفلكة (S) وشعاعها R

(2) أحسب : $d(\Omega; (P))$ وتأكد أن (P) يقطع الفلكة في نقطة

وحيدة T

(3) حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم (Δ) المار من Ω

والعمودي على (P)

(4) استنتج احداثيات T نقطة تماس الفلكة (S) و المستوى (P)

$$\text{أجوبة: } x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 2z - 1 = 0$$

على الشكل : $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

اذن لدينا : $a = 2$ و $b = -2$ و $c = 2$ و $d = -1$

$$\text{نحسب : } a^2 + b^2 + c^2 - 4d$$

$$a^2 + b^2 + c^2 - 4d = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 > 0$$

ومنه : (S) فلكة مركزها $\Omega\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; \frac{c}{2}\right)$ أي $\Omega(-1; 1; -1)$

$$\text{و شعاعها هو: } R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}}{2} \text{ أي: } R = \frac{\sqrt{16}}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\underline{(2)} \quad 2x + y + 2z - 3 = 0 \text{ و } \Omega(-1; 1; -1)$$

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|2 \times (-1) + 1 + 2 \times (-1) - 3|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{|6|}{3} = \frac{6}{3} = 2 = R$$

ومنه : (P) يقطع الفلكة في نقطة وحيدة T

نقول (P) مماس للفلكة (S) في T

(3) (Δ) يمر من Ω وعمودي على (P) ونعلم أن : $\vec{n}(2; 1; 2)$

متجهة منظمية على (P)

$$(\Delta) \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 1t + 1; (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2t - 1 \end{cases} \text{ اذن تمثيل بارامتري ل } (\Delta) \text{ هو :}$$

$$(4) \quad T(x; y; z) \in (\Delta) \cap (P)$$

$$\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 1t + 1; (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2t - 1 \end{cases} \text{ و } (P) \quad 2x + y + 2z - 3 = 0$$

$$\text{اذن : } 2(2t - 1) + (t + 1) + 2(2t - 1) - 3 = 0$$

$$\text{يعني } 9t - 6 = 0 \text{ يعني } t = \frac{2}{3} \text{ وبالتعويض في التمثيل البارامتري}$$

نجد

$$\text{ومنه: } T\left(\frac{1}{3}; \frac{5}{3}; \frac{1}{3}\right) \text{ نقطة التماس} \begin{cases} x = 2 \times \frac{2}{3} - 1 \\ y = 1 \times \frac{2}{3} + 1; (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2 \times \frac{2}{3} - 1 \end{cases}$$

تمرين 17: لتكن (S) الفلكة التي مركزها $\Omega(2; 0; 1)$ شعاعها

$$R = 3 \text{ والمستوى } (P)$$

$$\text{بالمعادلة: } x - 2y + z + 3 = 0$$

(1) حدد معادلة ديكرتية للفلكة (S)

2) أحسب : $d(\Omega; (P))$ وتأكد أن (P) يقطع الفلكة وفق دائرة

(C) يتم تحديد شعاعها r

3) حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم (Δ) المار من Ω

والعمودي على (P)

4) استنتج احداثيات H مركز الدائرة (C)

أجوبة : 1) اذن : $(x-2)^2 + (y-0)^2 + (z-1)^2 = 3^2$

يمكن الاكتفاء بهذه الكتابة أو نشرها فنجد :


$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + z^2 - 2z + 1 = 9$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2z - 4 = 0$$

$$\Omega(2;0;1) \text{ و } x-2y+z+3=0 \quad \underline{2}$$

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|2+4|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+1^2}} = \frac{|6|}{\sqrt{6}} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6} < R=3$$

ومنه : (P) يقطع الفلكة وفق دائرة (C)



نلاحظ أننا نحصل على مثلث قائم الزاوية في H

ومنه حسب فيثاغورس فان : $r = \sqrt{R^2 - d^2}$

$$r = \sqrt{3^2 - \sqrt{6}^2} = \sqrt{9-6} = \sqrt{3}$$

$$\Omega(2;0;1) \text{ و } (P) \quad x-2y+z+3=0 \quad (3)$$

(Δ) يمر من Ω وعمودي على (P) ونعلم أن : $\vec{n}(1; -2; 1)$

متجهة منظمية على (P)

$$(\Delta) \begin{cases} x=1t+2 \\ y=-2t; (t \in \mathbb{R}) \\ z=1t+1 \end{cases}$$

$$H(x; y; z) \in (\Delta) \cap (P) \quad (4)$$

$$(\Delta) \begin{cases} x=1t+2 \\ y=-2t; (t \in \mathbb{R}) \text{ و } (P) \quad x-2y+z+3=0 \\ z=1t+1 \end{cases}$$

$$(t+2) - 2(-2t) + (t+1) + 3 = 0$$

اذن : $6t + 6 = 0$ يعني $t = -1$ وبالتعويض في

التمثيل البارامترى نجد :

$$(\Delta) \begin{cases} x=-1+2 \\ y=-2(-1) \\ z=-1+1 \end{cases}$$

ومنه : $H(1; 2; 0)$ مركز الدائرة (C)

تمرين 18: لتكن (S) الفلكة التي معادلتها هي:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x = 0 \text{ و المستوى } (P)$$

الذي معادلته الديكارتية هي : $x + y - z + 2 = 0$

1) حدد المركز Ω للفلكة (S) وشعاعها R

2) أحسب : $d(\Omega; (P))$ ماذا تستنتج ؟

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x = 0 \quad \underline{1}$$

على الشكل : $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

اذن لدينا : $a = -2$ و $b = 0$ و $c = 0$ و $d = 0$

$$\text{نحسب : } a^2 + b^2 + c^2 - 4d$$

$$a^2 + b^2 + c^2 - 4d = 4 > 0$$

ومنه : (S) فلكة مركزها $\Omega\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; \frac{c}{2}\right)$ أي : $\Omega(1;0;0)$

$$\text{و شعاعها هو : } R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}}{2} \text{ أي : } R = \frac{\sqrt{4}}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\underline{2} \quad x + y - z + 2 = 0 \text{ و } \Omega(1;0;0)$$

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|1+2|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}} = \frac{|3|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} > R=1$$

ومنه : (P) يوجد خارج الفلكة (S) أو لا يقطع الفلكة

تمرين 19: لتكن (S) الفلكة التي معادلتها الديكارتية هي :

$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y + 2z = 5$$

والمستوى (P) المعروف ب $2x - 2y + z + 3 = 0$

1) حدد المركز Ω للفلكة (S) وشعاعها R

2) بين أن (P) يقطع الفلكة وفق دائرة (C) يتم تحديد شعاعها r

3) حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم (Δ) المار من Ω والعمودي على

(P)

4) استنتج احداثيات H مركز الدائرة (C)

$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y + 2z = 5 \quad \underline{1}$$

على الشكل : $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$

اذن لدينا : $a = -2$ و $b = 6$ و $c = 2$ و $d = -5$

$$\text{نحسب : } a^2 + b^2 + c^2 - 4d$$

$$a^2 + b^2 + c^2 - 4d = 64 > 0$$

ومنه : (S) فلكة مركزها $\Omega\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; \frac{c}{2}\right)$ أي : $\Omega(1; -3; -1)$

$$\text{و شعاعها هو : } R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}}{2} \text{ أي : } R = \frac{\sqrt{64}}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

$$\underline{2} \quad (P) : 2x - 2y + z + 3 = 0 \text{ و } \Omega(1; -3; -1)$$

$$d(\Omega; (P)) = \frac{|2+6-1+3|}{\sqrt{4+4+1}} = \frac{|10|}{3} = \frac{10}{3} < R=4$$

ومنه : (P) يقطع الفلكة وفق دائرة (C)

$$S(\Omega; R) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z = 5 \quad (2)$$

نحدد مركز الفلكة : $a = 2$ و $b = 4$ و $c = -6$

ومنه : (S) فلكة مركزها $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)$ أي $\Omega(-1; -2; 3)$


لتكن $M(x; y; z)$: $A(2; -1; 0)$

$\overline{AM} \cdot \overline{A\Omega} = 0$ يعني $M(x; y; z) \in (P)$

$\overline{A\Omega}(-3; -1; 3)$ و $\overline{AM}(x-2; y+1; z)$

يعني $-3(x-2) - (y+1) + 3z = 0$

يعني $(P) -3x - y + 3z + 5 = 0$



$$r = \sqrt{4^2 - \left(\frac{10}{3}\right)^2} = \sqrt{16 - \frac{100}{9}} = \sqrt{\frac{44}{9}} = \frac{\sqrt{44}}{3} = \frac{2\sqrt{11}}{3}$$

$\Omega(1; -3; -1)$ و $(P) : 2x - 2y + z + 3 = 0 \quad (3)$

(Δ) يمر من Ω وعمودي على (P) ونعلم أن $\vec{n}(2; -2; 1)$

متجهة منظمة على (P)

$$(\Delta) \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -2t - 3; (t \in \mathbb{R}) \\ z = 1t - 1 \end{cases}$$

$H(x; y; z) \in (\Delta) \cap (P) \quad (4)$

$$(\Delta) \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -2t - 3 \text{ و } (P) : 2x - 2y + z + 3 = 0 \\ z = 1t - 1 \end{cases}$$

اذن : $2(2t+1) - 2(-2t-3) + (t-1) + 3 = 0$

يعني $9t + 10 = 0$ يعني $t = -\frac{10}{9}$ وبالتعويض في التمثيل

البارامترى نجد

$$(C) \begin{cases} x = -\frac{11}{9} \\ y = -\frac{7}{9} \\ z = -\frac{19}{9} \end{cases}$$

ومنه : $H\left(-\frac{11}{9}; -\frac{7}{9}; -\frac{19}{9}\right)$ مركز الدائرة (C)

تمرين 20:

$$S(\Omega; R) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z = 5$$

(1) بين أن $A(2; -1; 0) \in (S)$

(2) حدد معادلة ديكارتية للمستوى (P) المماس ل (S) في A

الجواب :

1 نعوض باحداثيات A في معادلة الفلكة ونجد أنها تحقق المعادلة

$$(S) : 2^2 + (-1)^2 + 0^2 + 2 \times 2 + 4 \times (-1) - 6 \times 0 = 5$$

