الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2018

-الموضوع-

NS24

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	4
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم الرياضية : "أ " و " ب "	المعامل	9

- مدة إنجاز الموضوع هي أربع ساعات.
- يتكون الموضوع من خمسة تمارين مستقلة فيما بينها.
- يمكن إنجاز التمارين حسب الترتيب الذي يرغب فيه المترشح.

- التمرين 1 يتعلق بالبنيات الجبرية.....(3.5 ن)
- التمرين 2 يتعلق بالحسابيات.....(3 ن)
- التمرين 3 يتعلق بالأعداد العقدية.....(3.5 ن)
- التمرين 4 يتعلق بالتحليل.....(7.5 ن)
- التمرين 5 يتعلق بالتحليل.....(2.5 ن)

لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة كيفما كان نوعها

لا يسمح باستعمال اللون الأحمر بورقة التحرير

التمرين 1: (3.5 نقطة)

نذكر أن $(\mathbb{C},+,\times)$ جسم تبادلي وأن $(M_2(\mathbb{C}),+,\times)$ حلقة واحدية، صفرها المصفوفة المنعدمة $O=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$

و وحدتها المصفوفة $I=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ و أن $(M_2(\mathbb{C}),+,.)$ فضاء متجهي حقيقي .

لكل زوج (x,y) من $\mathbb{R}^2$ نضع : $M(x,y)=\begin{pmatrix}x&-2y\\y&x+2y\end{pmatrix}$

و نعتبر المجموعة $E=\{M(x,y)/(x,y)\in\mathbb{C}^2\}$

0.25 | 1- بين أن E زمرة جزئية للزمرة $(M_2(\mathbb{C}),+)$

0.25 | 2- أ) بين أن E فضاء متجهي جزئي للفضاء المتجهي $(M_2(\mathbb{C}),+,.)$

0.5 | ب) نضع $J=M(0,1)$. بين أن (I,J) أساس للفضاء المتجهي الحقيقي $(E,+,.)$

0.5 | 3- أ) بين أن E جزء مستقر من $(M_2(\mathbb{C}),\times)$

0.5 | ب) بين أن $(E,+,\times)$ حلقة تبادلية.

4- ليكن φ التطبيق من $\mathbb{C}^*$ نحو $M_2(\mathbb{C})$ المعرف بما يلي:

$$\forall (x,y)\in\mathbb{C}^2-\{(0,0)\}\ ;\ \varphi(x+iy)=M(x+y,-y)=\begin{pmatrix}x+y&2y\\-y&x-y\end{pmatrix}$$

0.5 | أ) بين أن φ تشاكل من $(\mathbb{C}^*,\times)$ نحو $(M_2(\mathbb{C}),\times)$

0.5 | ب) نضع $E^*=E-\{O\}$. بين أن: $\varphi(\mathbb{C}^*)=E^*$

0.25 | ج) استنتج أن $(E^*,\times)$ زمرة تبادلية.

0.25 | 5- بين أن $(E,+,\times)$ جسم تبادلي.

التمرين 2: (3 نقط)

ليكن p عددا أوليا بحيث: $p=3+4k$ $(k\in\mathbb{N}^*)$

0.5 | 1- بين أن لكل عدد صحيح نسبي x ، إذا كان $x^2\equiv 1\ [p]$ فإن $x^{p-5}\equiv 1\ [p]$

2- ليكن x عددا صحيحا نسبيا يحقق: $x^{p-5}\equiv 1\ [p]$

0.5 | أ) بين أن x و p أوليان فيما بينهما.

0.5 | ب) بين أن: $x^{p-1}\equiv 1\ [p]$

0.5 | ج) تحقق أن: $2+(k-1)(p-1)=k(p-5)$

0.5 | د) استنتج أن: $x^2\equiv 1\ [p]$

0.5 | 3- حل في $\mathbb{Z}$ المعادلة : $x^{62}\equiv 1\ [67]$

التمرين 3: (3.5 نقطة)

ليكن m عددا عقديا.

I- نعتبر في مجموعة الأعداد العقدية المعادلة (E_m) ذات المجهول z :

$$z^2+(im+2)z+im+2-m=0$$

0,25 | 1- أ) تحقق أن $\Delta=(im-2i)^2$ هو مميز المعادلة (E_m)

0,5 | ب) إعط حسب قيم العدد m مجموعة حلول المعادلة (E_m)

0,5 | 2- من أجل $m=i\sqrt{2}$ ، اكتب حلي المعادلة (E_m) على الشكل الأسي.

II- المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O;\vec{u},\vec{v})$

نعتبر النقط A و Ω و M و M' ذات الألحاق على التوالي $a=-1-i$ و $\omega=i$ و m و $m'=-im-1+i$

1- ليكن R الدوران الذي زاويته $-\frac{\pi}{2}$ و يحول M إلى M'.

0.25 | أ) تحقق أن Ω هو مركز الدوران R

0.5 | ب) حدد b لحق النقطة B التي تحقق : $A=R(B)$

0,5 | 2- أ) تحقق أن: $m'-a=\frac{\omega-a}{\omega-b}(m-b)$

0,5 | ب) استنتج أن النقط A و M و M' تكون مستقيمية إذا و فقط إذا كانت النقط A و B و Ω و M متداورة.

0,5 | ج) بين أن مجموعة النقط M بحيث تكون النقط A و M و M' مستقيمية هي دائرة يجب تحديد مركزها و شعاعها.

التمرين 4:(7.5 نقطة)

الجزء I :

0.5 | 1- أ) بين أن: $\int_0^x \frac{t}{1+t}dt=x-\ln(1+x)$; $(\forall x\in]0,+\infty[)$

ب) باستعمال تغيير المتغير : $u=t^2$ بين أن:

0.5 | $\int_0^x \frac{t}{1+t}dt=\frac{1}{2}\int_0^{x^2}\frac{1}{1+\sqrt{u}}du$; $(\forall x\in]0,+\infty[)$

0.5 | ج) استنتج أن: $\frac{1}{2(1+x)}\le\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}\le\frac{1}{2}$; $(\forall x\in]0,+\infty[)$

0.25 | 2- حدد : $\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$

الجزء II :

نعتبر الدالة f المعرفة على $[0,+\infty[$ بما يلي:
$$\begin{cases} f(x)=\left(\dfrac{x+1}{x}\right)\ln(1+x) \quad ; \quad x\neq 0 \\ f(0)=1 \end{cases}$$

و ليكن (C) منحناها في معلم متعامد ممنظم $(O;\vec{i},\vec{j})$

0.25 1- أ) بين أن f متصلة على اليمين في 0

0.5 ب) بين أن f قابلة للاشتقاق على اليمين في 0 (يمكن استعمال نتيجة السؤال I-2).

0.75 ج) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ ثم أول مبيانيا النتيجة المحصل عليها.

0.5 2- أ) بين أن f قابلة للاشتقاق على $]0,+\infty[$ ثم تحقق أن:
$$(\forall x\in]0,+\infty[) \quad ; \quad f'(x)=\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$$

0.25 ب) استنتج أن f تزايدية قطعا على $[0,+\infty[$

0.25 ج) تحقق أن: $f([0,+\infty[)=[1,+\infty[$

0.5 3- مثل مبيانيا المنحنى (C) (يتم إنشاء نصف المماس على اليمين في النقطة ذات الأفصول 0).

الجزء III :

1- نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $]0,+\infty[$ بما يلي: $g(x)=f(x)-x$

0.5 أ) بين أن: $(\forall x\in]0,+\infty[) \quad ; \quad 0\leq f'(x)\leq\dfrac{1}{2}$

0.5 ب) استنتج أن الدالة g تناقصية قطعا على $]0,+\infty[$ ثم بين أن: $g(]0,+\infty[)=]-\infty,1[$

0.25 ج) بين أن المعادلة $f(x)=x$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]0,+\infty[$

2- ليكن a عددا حقيقيا من المجال $]0,+\infty[$

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\geq 0}$ المعرفة بما يلي: $u_0=a$ و $u_{n+1}=f(u_n) \quad ; \quad (\forall n\in\mathbb{N})$

0.25 أ) بين أن: $(\forall n\in\mathbb{N}) \quad ; \quad u_n>0$

0.5 ب) بين أن: $(\forall n\in\mathbb{N}) \quad ; \quad |u_{n+1}-\alpha|\leq\dfrac{1}{2}|u_n-\alpha|$

0.5 ج) بين بالترجع أن: $(\forall n\in\mathbb{N}) \quad ; \quad |u_n-\alpha|\leq\left(\dfrac{1}{2}\right)^n|a-\alpha|$

0.25 د) استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n\geq 0}$ تؤول إلى α

التمرين 5: (2.5 نقطة)

نعتبر الدالة F المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي: $F(x)=\int_0^x e^{t^2}dt$

0.5 | 1- بين أن F متصلة و تزايدية قطعا على $\mathbb{R}$

0.5 | 2- أ) بين أن: $F(x)\geq x$; $(\forall x\in[0,+\infty[)$ ثم استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)$

0.5 | ب) بين أن F فردية ثم استنتج $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)$

0.5 | ج) بين أن F تقابل من $\mathbb{R}$ نحو $\mathbb{R}$

0.5 | د) بين أن دالة التقابل العكسي G للدالة F قابلة للاشتقاق في 0 ثم احسب $G'(0)$

انتهى