


# الهجونة الثنائية: حالة مورثتين مرتبطتين

عندما يتعلق الأمر بدراسة الهجونة الثنائية، نميز حالتين حسب تموير المورثتين المدروستين، حالة المورثتين المستقلتين (كما تم التطرق لها سابقاً) خلال و حالة ارتباط المورثتين، أي عندما تكون الأخيرتان على نفس الصبغي. لتحديد القوانين المتحكمة في انتقال مورثتين مرتبطتين تقترح دراسة المعطيات التالية:

## المعطيات



### الوثيقة 1 : انتقال صفتى لون الجسم وشكل الأجنحة عند ذبابة الخل:

#### التجربة الأولى:

تم إنجاز تزاوج بين سلالتين نقيتين من ذبابة الخل تختلفان بزوج من الصفات الوراثية: لون الجسم وشكل الأجنحة. السلالة الأولى ذات جسم أسود وأجنحة أثيرة، والسلالة الثانية ذات جسم رمادي وأجنحة طويلة. أعطى هذا التزاوج ذباباً كله بجسم رمادي وأجنحة طويلة.

#### التجربة الإختباري الأول:

بين ذكر هجين وأنثى ثانية التتحى بالنسبة للصفتين السابقتين وأعطى هذا التزاوج ذباباً 50% منه ذو جسم رمادي وأجنحة طويلة و 50% ذو جسم أسود وأجنحة أثيرة.

#### التجربة الإختباري الثاني:

بين أنثى هجينة وذكر ثانية التتحى وأعطى هذا التزاوج النتائج التالية:

- 174 ذباب ذو جسم رمادي وأجنحة طويلة.
- 171 ذباب ذو جسم أسود وأجنحة أثيرة.
- 35 ذباب ذو جسم رمادي وأجنحة أثيرة.
- 35 ذباب ذو جسم أسود وأجنحة طويلة.

### الوثيقة 2 : تمرن تطبيقي (الدورة العادلة 2007 SVT)

للحصول على طماطم ذات إنتاجية جيدة تم إنجاز التزاوجين التاليين :

▪ التزاوج الأول : بين سلالتين من طماطم، الأولى حساسة للطفيلي *Stemphyllium* و منتجة لثمار سهلة القطف (صفة jointless)، و الثانية مقاومة للطفيلي *Stemphyllium* و منتجة لثمار صعبة القطف (غياب jointless). قم الحصول على جيل F1 يتكون من نباتات كلها مقاومة للطفيلي و منتجة لثمار صعبة القطف.

1- ماذا تستخلص من نتائج هذا التزاوج ؟ (0.75)

▪ التزاوج الثاني : بين أفراد F1 و نباتات حساسة للطفيلي *Stemphyllium* و منتجة لثمار سهلة القطف، فتم الحصول على الجيل F2 يتكون من :

- 11% من نباتات مقاومة للطفيلي و منتجة لثمار سهلة القطف
- 39% من نباتات مقاومة للطفيلي و منتجة لثمار صعبة القطف
- 11% من نباتات حساسة للطفيلي و منتجة لثمار صعبة القطف
- 39% من نباتات حساسة للطفيلي و منتجة لثمار سهلة القطف

2- هل المورثتان المدروستان مرتبطتان أم مستقلتان ؟ عل إجابتك.

ب- أجز شبكة التزاوج لتفصيل نتائج التزاوج الثاني (استعمل N أو n بالنسبة للمورثة المسئولة عن صفة jointless، و R أو r بالنسبة للمورثة المسئولة عن مقاومة الطفيلي).

3- أجز رسوماً تخطيطية تبرز الظاهراً المسؤول عن المظاهر الخارجية جديدة التركيب في الجيل F2.

4- اقترح تزاوجاً بين أفراد الجيل F2 يسمح بالحصول على نباتات طماطم ذات إنتاجية جيدة ( مقاومة للطفيلي و منتجة لثمار سهلة القطف ) بنسبة كبيرة. عل إجابتك بشبكة التزاوج.

## استئثار المطاعيم

- I- انتقال صفتى لون الجسم وشكل الأجنحة عند ذبابة الخل (الوثيقة 1)
  - 1- حل نتائج التزاوج الأول ثم استنتاج.
  - 2- هل المورثتين مستقلتين أم مرتبطتين. عل جوابك.
  - 3- فسر ظهور أربع مظاهر خارجية في هذا التزاوج رغم رغم ما استنتاجه في السؤال السابق.
  - 4- أجز التأويل الصبغي للتزواوجات الثلاث.
- أنجز التمرن التطبيقي (وثيقة 2).