

تصحيح تمارين التفاعلات المقرونة بالتفاعلات حمض قاعدة

حل التمرين 1 :


1- حساب التركيز C :

$$C = \frac{n(C_6H_8O_6)}{V} = \frac{m}{M(C_6H_8O_6) \cdot V}$$

ت.ع :

$$C = \frac{88 \cdot 10^{-3}}{176 \times 100 \cdot 10^{-3}} = 5 \cdot 10^{-3}$$

2- معادلة التفاعل :



3- الجدول الوصفي :

معادلة التفاعل		$C_6H_8O_6(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons C_6H_7O_6^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
حالة المجموعة	التقدم : $x(mol)$	كميات المادة بالمول			
البدئية	0	$C \cdot V$ $= 5 \cdot 10^{-4}$	وفير	0	0
خلال التحول	x	$C \cdot V - x$	وفير	x	x
النهائية	x_f	$C \cdot V - x_f$	وفير	x_f	x_f

بما أن الماء مستعمل بوفرة فإن المتفاعل المحد هو حمض الأسكوربيك :

$$C \cdot V - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = C \cdot V = 5 \cdot 10^{-4} mol$$

4- حساب x_f التقدم النهائي :

$$[H_3O^+]_{\acute{e}q} = [C_6H_7O_6^-]_{\acute{e}q} = \frac{x_f}{V}$$

$$x_f = V \cdot [H_3O^+]_{\acute{e}q} = V \cdot 10^{-PH}$$

ت.ع :

$$x_f = 100 \cdot 10^{-3} \times 10^{-3,2} = 6,3 \cdot 10^{-5} mol$$

5- حساب τ نسبة التقدم النهائي :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

ت.ع :

$$\tau = \frac{6,3 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 10^{-4}} = 0,126 < 1$$

نستنتج أن الفاعل محدود .
6-حساب K ثابتة التوازن :

$$K = \frac{[H_3O^+]_{\acute{e}q}[C_6H_8O_6^-]_{\acute{e}q}}{[C_6H_8O_6]_{\acute{e}q}}$$

من الجدول الوصفي :

$$[C_6H_8O_6]_{\acute{e}q} = \frac{C \cdot V - x_f}{V} = C - \frac{x_f}{V}$$

$$[C_6H_8O_6]_{\acute{e}q} = C - [H_3O^+]_{\acute{e}q}$$


$$K = \frac{[H_3O^+]_{\acute{e}q}[C_6H_8O_6^-]_{\acute{e}q}}{[C_6H_8O_6]_{\acute{e}q}} = \frac{[H_3O^+]_{\acute{e}q}^2}{C - [H_3O^+]_{\acute{e}q}}$$

ت.ع:

$$K = \frac{\left(\frac{6,3 \cdot 10^{-5}}{0,1}\right)^2}{5 \cdot 10^{-5} - \frac{6,3 \cdot 10^{-5}}{0,1}} = 9,1 \cdot 10^{-5}$$

تمرين 2 :

1-معادلة التفاعل :



2-حساب التركيز C_2 :

لنحسب أولاً C_1 تركيز المحلول (S_1) :

$$\begin{cases} n = \frac{V(HCl)}{V_m} \\ C_1 = \frac{n}{V_1} \end{cases} \Rightarrow C_1 = \frac{V(HCl)}{V_m \cdot V_1} \Rightarrow C_1 = \frac{1,2}{24 \times 1} = 5 \cdot 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$$

علاقة التخفيف :

$$C_1 \cdot V = C_2 \cdot V_2 \Rightarrow C_2 = \frac{C_1 \cdot V}{V_2} \Rightarrow C_2 = \frac{5 \cdot 10^{-2} \times 10^{-2}}{0,25} = 2 \cdot 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$$

3-موصلية المحلول σ_2 نكتب :

$$\sigma_2 = \lambda(H_3O^+) \cdot [H_3O^+] + \lambda(Cl^-)[Cl^-]$$

4- حساب تراكيز الأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول :

معادلة التفاعل		$HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$			
حالة المجموعة	التقدم : $x(mol)$	كميات المادة بالمول			
البدئية	0	$C.V$ $= 5.10^{-4}$	وفير	0	0
خلال التحول	x	$C.V - x$	وفير	x	x
النهائية	x_f	$C.V - x_f$	وفير	x_f	x_f

حسب الجدول الوصفي لدينا :

$$[H_3O^+] = [Cl^-] = \frac{x_f}{V_2}$$

$$\sigma_2 = [H_3O^+] \{ \lambda(H_3O^+) + \lambda(Cl^-) \}$$

$$[H_3O^+] = \frac{\sigma_2}{\lambda(H_3O^+) + \lambda(Cl^-)}$$

ت.ع:

$$[H_3O^+] = [Cl^-] = \frac{0,0852 S.m^{-1}}{35.10^{-3} + 7,6.10^{-3}} S.m^2.mol^{-1} = 2 mol.m^{-3} = 2.10^{-3} mol.L^{-1}$$

لدينا : $Ke = [H_3O^+]. [HO^-]$

$$[HO^-] = \frac{Ke}{[H_3O^+]}$$

$$[HO^-] = \frac{10^{-14}}{2.10^{-2}} = 5.10^{-12} mol.L^{-1}$$

5- مقارنة تركيز أيونات HO^- بتراكيز الأيونات الأخرى :

$$\frac{[HO^-]}{[H_3O^+]} = \frac{[HO^-]}{[Cl^-]} = \frac{5.10^{-12}}{2.10^{-3}} = 2,5.10^{-9} \ll 1$$

نستنتج أن تركيز أيونات HO^- مهمل أمام تراكيز الأيونات الأخرى المتواجدة في المحلول .

6- نلاحظ أن $[H_3O^+] = C_2$ بالتالي التفاعل كلي.

تصحيح تمرين 3 :

1- معادلة الذوبان :



2- حساب التركيز C_1 :

$$C_1 = \frac{m}{M(HCOOH).V} = \frac{68.10^{-3}}{68 \times 0,1} = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$$


3- حسب تعريف الموصلية نكتب:

$$\sigma = \lambda(Na^+)[Na^+] + \lambda(HCOO^-)[HCOO^-] = C_1(\lambda(Na^+) + \lambda(HCOO^-))$$


$$C_1 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1} = 0,01 \text{ mol} / 10^{-3} \cdot \text{m}^3 = 10 \text{ mol.m}^{-3}$$

$$\sigma = 10 \text{ mol.m}^{-3} (5,46 + 5,01) \cdot 10^{-3} \text{ S.m}^2 \cdot \text{mol}^{-1} = 0,105 \text{ S.m}^{-1}$$

4- المزدوجتين المتدخلتين في التفاعل :



5- معادلة التفاعل :



6- حساب كمية المادة البدئية للمتفاعلين :

$$n_i(HCOO^-) = C_1.V_1 = 0,01 \times 0,1 = 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_i(H_3O^+) = C_2.V_2 = 1,1 \times 0,05 = 5,5.10^{-2} \text{ mol}$$

جدول التقدم :

معادلة التفاعل		$HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)}$			
حالة المجموعة	التقدم : $x(\text{mol})$	كميات المادة بالمول			
البدئية	0	0,001	0,055	0	0
خلال التحول	x	$0,001 - x$	$0,055 - x$	x	x
النهائية	x_f	$0,001 - x_f$	$0,055 - x_f$	x_f	x_f

المتفاعل المحد هو $HCOO^-$ والتقدم الأقصى :

$$0,001 - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 0,01 \text{ mol}$$

7- الموصلية G تكتب :

$$G' = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$$

$$G' = \frac{38.10^{-3}}{1} = 38.10^{-3} \text{ S}$$

استنتاج الموصلية σ :

$$G' = \sigma' \frac{S}{L} \Rightarrow \sigma' = G' \frac{L}{S}$$

$$\sigma' = 38.10^{-3} \text{ S} \times \frac{10^{-2} \text{ m}}{3,21.10^{-4} \text{ m}^2} = 1,18 \text{ S.m}^{-1}$$

8- تعبير الموصلية σ' :

حسب السؤال 6 لدينا: $n_i(HCOO^-) = C_1 \cdot V_1$

$$n_i(H_3O^+) = C_2 \cdot V_2$$

المتفاعل المحد هو $HCOO^-$ والتقدم الأقصى :

$$C_1 \cdot V_1 - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = C_1 \cdot V_1 = 0,01 \text{ mol}$$

الجدول الوصفي يكتب :

معادلة التفاعل		$HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)}$			
حالة المجموعة	التقدم : $x(\text{mol})$	كميات المادة ب (mol)			
البدئية	0	$C_1 \cdot V_1$	$C_2 \cdot V_2$	0	0
خلال التحول	x	$C_1 \cdot V_1 - x$	$C_2 \cdot V_2 - x$	x	x
النهائية	x_{max} $= C_1 \cdot V_1$	0	$C_2 \cdot V_2 - C_1 \cdot V_1$	$C_1 \cdot V_1$	$C_1 \cdot V_1$


موصلية الخليط :

$$\sigma' = \lambda(H_3O^+)[H_3O^+] + \lambda(Na^+)[Na^+] + \lambda(Cl^-)[Cl^-]$$


$$\sigma' = \lambda(H_3O^+) \frac{C_2 V_2 - C_1 V_1}{V_1 + V_2} + \lambda(Na^+) \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2} + \lambda(Cl^-) \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

تصحيح تمرين 4 :

1- معادلة تفاعل الحمض مع الماء :



المزدوجتان قاعدة / حمض المتفاعلتان :



2- الجدول الوصفي :

معادلة التفاعل		$CHCl_2COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CHCl_2COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
حالة المجموعة	التقدم : $x(\text{mol})$	كميات المادة بالمول			
البدئية	0	$C \cdot V$	وفير	0	0
خلال التحول	x	$C \cdot V - x$	وفير	x	x
النهائية	$x_{\acute{e}q}$	$C \cdot V - x_{\acute{e}q}$	وفير	$x_{\acute{e}q}$	$x_{\acute{e}q}$

4- نسبة التقدم النهائي :

$$\tau = \frac{x_{\acute{e}q}}{x_{max}}$$

بما أن الماء مستعمل بوفرة فإن المتفاعل المحد هو $CHCl_2COOH$ وبالتالي :

$$C.V - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = C.V$$

حسب الجدول الوصفي : $[H_3O^+] = \frac{x_{\acute{e}q}}{V}$ ومنه : $x_{\acute{e}q} = [H_3O^+].V = 10^{-pH}.V$

$$\tau = \frac{10^{-pH}.V}{C.V} = \frac{10^{-pH}}{C}$$

$$\tau = \frac{10^{-1,3}}{0,1} = 0,5$$

نلاحظ أن $\tau < 1$ وبالتالي التفاعل محدود .

- عند إضافة الحمض فإن تركيز C يتزايد ونسبة التقدم النهائي $\tau = \frac{10^{-pH'}}{C'}$ تتناقص .

4-2- كمية مادة حمض ثنائي كلورو إيثانويك الموجودة في القطرة :

$$n = \frac{\rho.V}{M} = \frac{d.\rho_{eau}.V_a}{M} = \frac{1,57 \times 1g.cm^{-3} \times 0,05cm^3}{129g.mol^{-1}} \approx 6,1.10^{-4}mol$$

حساب نسبة التقدم النهائي:

$$\tau = \frac{x'_{\acute{e}q}}{x'_{max}} = \frac{10^{-PH'}}{C'}$$

حساب C' :

$$C' = \frac{CV+n}{V} = C + \frac{n}{V} = 0,1 + \frac{6,1.10^{-4}}{0,1} = 0,106$$

$$\tau = \frac{10^{-1,28}}{0,106} = 0,495$$

نلاحظ أن التركيز قد تزايد قليلا و نسبة التقدم النهائي انخفضت قليلا عند إضافة قطرة الحمض .
 τ تتناقص بازدياد التركيز والعكس صحيح .