

النشاط 0: هل تتواءل أعضاء الجسم؟ وكيف؟

الوضعية

يكون جسم الإنسان من عدة أعضاء (دماغ، قلب، رئة....). كل عضو له وظيفة معينة وكلها تعمل على ضمان عمل الجسم بشكل طبيعي فهل كل عضو يعمل بمفرز عن الآخر أم أن هناك تواصل بين الأعضاء؟ وما طبيعة ذلك التواصل؟ وكيف يحدث؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نقترح الاعتماد على الأسناد التالية:

الأسناد

• مقطع فيديو من الفيلم الوثائقي عالم الهرمونات الساحر .The Fantastical World of Hormones

الوثيقة 2: عندما يتعرض الإنسان لموقف يشعره بالخوف أو الرهبة يعرف جسمه عدة ردود فعل ذكر منها: ارتفاع نبضات القلب، الارتعاش، جفاف اللعاب، فقدان التركيز وارتفاع تردد التنفس....



الوثيقة 1: يعتبر الشلل السفلي من الأمراض الخطيرة التي ابتلي به كثير من الناس ومنهم الأطفال والشباب ويتميز المرض بفقدانهم القدرة على تحريك أعضاء جسمهم السفلي وعدم الإحساس بها رغم جريان الدم فيها وتترجم أغلب حالات الشلل السفلي لخلل في وظيفة النخاع الشوكي الذي يعتبر من عناصر الجهاز العصبي المركزي

التعليمات

باستغلالك لمعطيات الأسناد، حدد أنواع التواصلات التي تحدث بين أعضاء الجسم مبيناً كيفية حدوث كل تواصل وهل يعمل كل تواصل بمعزل عن الآخر أم أن هناك اندماج في عمل التواصلات داخل جسم الإنسان.

النشاط 1: مرض السكري خلل في ثبات نسبة السكر في الدم


لا يكاد يخلو بيت اليوم من فرد أو أفراد مصابين بمرض السكري حيث يعاني المرضى من ارتفاع نسبة السكر في دمهم إضافة لأعراض أخرى مثل كثرة شرب الماء والتبول وفقدان الوزن أو العكس وهذا يدفعهم إما لاعتماد حمية غذائية خالية من المواد السكرية أو اعتماد الأدوية أو الحقن اليومية التي تتكون من هرمون الانسولين مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في دم المريض فهل تبقى تكون نسبة السكر في الدم ثابتة دائمة في الحالة الطبيعية؟ وما قيمتها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نقترح الاعتماد على الأسناد التالية:

الأسناد




الوثيقة 1: الكشف عن وجود الكليكوز في الدم
للكشف عن وجود الكليكوز في الدم يمكن اللجوء إلى طريقتين مختلفتين:
★ استعمال لالسيتات التفاعلي Bandelettes réactives (الشكل أ) وهي عبارة عن شريط تفاعلي بياع في الصيدليات.
نبال شريط تفاعلاً في دم طري، نقارن اللون الذي يأخذ الشريط بمقاييس مرجعى وهكذا نتوصل إلى تحديد قيمة تقريبية لنسبة الكليكوز في الدم.

★ استعمال جهاز قياس الكترونی (الشكل ب):
نضع قليلاً من الدم على شريط يحتوي على منطقة مخصصة لذلك ثم نضع الشريط في جهاز إلكترونی يحتوى على نظام يمكنه من قياس يمكنه من قياس نسبة السكر في الدم. تظهر النتيجة على لوحة إلكترونية ب mg/dl (لتحويل هذه القيمة إلى g/l نقسم العدد المحصل على 100). تمكن هذه التقنية من مراقبة نسبة الكليكوز في الدم بسهولة وبسرعة لعدة مرات في اليوم.



الوثيقة 2: الكشف عن ثبات قيمة تحلون الدم
★ بعد فترة صيام دامت 12 ساعة تناول شخص سليم 100g من الكليكوز، ثم قمنا بمعاييرة الكليكوز في دم هذا الشخص فحصلنا على النتائج الممثلة على المبيان أمامه (الشكل أ).
★ يعطي مبيان الشكل ب من الوثيقة تغيرات تحلون الدم عند شخص سليم خلال 24 ساعة.



التعليمات

- اعتماداً على معطيات الوثيقة 1، بين معيلاً جوابك أي الطريقة أفضل في قياس تحلون الدم.
- انطلاقاً من وصف مبيانات الوثيقة 2، مادا تستنتج بخصوص قيمة تحلون الدم في الجسم؟

النشاط 2: دور الكبد في تنظيم تحلون الدم

الوضعية

Le foie هو عضو أساسي في الحفاظ على توازن الجسم له ثلاثة أدوار أساسية وهي التخزين والتركيب والتنظيف حيث يستقبل كمية مهمة من الدم القادم من الجهاز الهضمي، ويذخن العناصر الغذائية الناتجة عن عملية الهضم ليحولها إلى جزيئات أكثر تعقيداً لتخزينها لاستعمالها في وقت لاحق حسب حاجاته كما يساهم الكبد في عمليات تركيب وتخزين السكريات والدهنيات وبعض أنواع البروتينات، ويقوم كذلك بانتاج الكوليسترول ومعدمه، كما يتدخل الكبد في تنظيف الجسم من السموم. للكشف عن دور الكبد في تنظيم تحول الدم نقترح المطاعيمات التالية:


الأسناد

تجربة 2: معايرة الكليكوز في الدم الداخل والدم الخارج من الكبد


الوثيقة 1

نقوم بقياس تخلون الدم على مستوى الوريد البابي والوريد فوق كبدي لشخص عادي بعد صيامه لبعض ساعات ثم بعد تناوله لوجبة غذائية.

تخلون الدم بـ g/l		بعد صوم لبعض ساعات	بعد تناول وجبة غذائية
في الوريد البابي	في الوريد فوق كبدي		
1,05 إلى 0,95	0,8		
1 إلى 1,2	2,5 أو أكثر		



لا يعيش كلب بعد استئصال الكبد سوى بضع ساعات، حيث يصاب بعدة اضطرابات من بينها الإغماء الناجم عن نقص في تزويد الخلايا العصبية للدماغ بالكليكوز. يمكن للكلب أن يستفيق من الإغماء ويسترجع تنفسه العادي إذا تم حقنه بمحلول للكليكوز غير أنه لا يواصل الحياة أكثر من 24 ساعة، لأن الكبد يلعب وظائف أخرى جد حيوية.



تجربة الكبد المغسولة (Claude Bernard 1855)

الوثيقة 2

أجريت تجربة «الكبد المغسولة» في سنة 1855 وقد وصفها Claude Bernard بهذه العبارات: «لقد اخترت كلباً بالغاً قوياً وفي صحة جيدة، تمت تغذيته خلال عدة أيام باللحام، ووضحت به بعد 7 ساعات من تناوله وجبة وافرة من الكروش Tripes».

أزيلت الكبد مباشرة وأخذت لغسل مستمر عن طريق الوريد البابي.

تركت هذه الكبد معروضة للغسل المستمر طيلة 40 دقيقة، فلاحظت في بداية التجربة أن الماء الملون بالأحمر الذي يخرج من الأوردة فوق الكبدية حلو. كما لاحظت في نهاية التجربة أن الماء الذي يخرج أصبح عديم اللون ولا يحتوي على أي آثار للسكر...

تركت هذه الكبد حتى درجة حرارة الوسط ورجعت بعد 24 ساعة، فلاحظت أن هذا العضو الذي تركته بالأمس فارغاً تماماً من السكر قد أصبح يحتوي على كمية وافرة منه».

وعلى ذلك بقوله: ...«ثبتت هذه التجربة أن الكبد الطريقة في الحالة الفيزيولوجية. أي أثناء عملها تحتوي على مادتين:

- السكر الشديد الذوبان في الماء ينقل بالغسل.

- مادة أخرى قليلة الذوبان في الماء. هذه المادة تحول شيئاً فشيئاً في الكبد التي تركتها إلى سكر، و حتى لا أعطي حكماً مسبقاً عن طبيعتها. سأسميها الكليكوجين Glycogène».

تجربة معايرة الكليكوجين الكبدي

الوثيقة 3


الأيام	خلال فترة صيام								كمية الكليكوجين بـ g/kg
	2	1	6	5	4	3	2	1	
88,5	84,2	6,9	7,1	7,1	7,3	30,1	50,80		

التعليمات

- اعتماداً على نتيجة التجربة 1 من الوثيقة 1، صف التغيرات المرافقة لاستئصال الكبد واستنتاج علاقته بتحلول الدم من خلال وصف نتيجة التجربة 2 من الوثيقة 1، استنتج كيف تتدخل الكبد في تنظيم تحلول الدم.
- هل تتضمن نتائج تجربة Claud bernard الممثلة في الوثيقة 2 أي معلومات إضافية حول علاقة الكبد بتحلول الدم؟ حددوها.
- علماً أن الكليكوجين هو سكر مركب يتكون من آلاف جزيئات الكليكوز حيث يتم تركيبيه انطلاقاً من الكليكوز عبر تفاعل يسمى تركيب الكليكوجين في حين التفاعل المعاكس يسمى حلامة الكليكوجين. صف نتائج تجربة معايرة الكليكوجين الكبدي الممثلة في الوثيقة 3 وباستغلالك لكل المطاعيمات السابقة وضم بواسطة خطاطة دور الكبد في تنظيم تحول الدم.

النشاط 3: دور البنكرياس في تنظيم تحلون الدم


الوثيقة 1




البنكرياس عضو من أعضاء الجهاز الهضمي يبلغ طوله 20cm وزنه 100g يساهم في عملية الهضم عبر إفرازه للعصارة الهضمية الغنية بالأنزيمات داخل المعايير الدقيق.

تجربة 1 :

- أجري باحثون في القرن 19 تجارب استئصال البنكرياس عند كلب. فلاحظوا نوعين من الإضطرابات (المنحنى جانبية):
 - اضطرابات هضمية ناجمة عن غياب العصارة البنكرياسية التي تلعب دوراً مهماً في الهضم.
 - ارتفاع سريع ومهماً في خلدون الدم يفضي إلى موت الحيوان بعد بضعة أسابيع في غياب العلاج.
 - ظهور السكر في البول (البليلة السكرية glycosuria).



- تجربة 2 :
- كما قام مجموعة من الباحثون بتجارب استئصال و زرع البنكرياس. يبين المنحنى جانبي النتائج التجريبية:




الوثيقة 2

يفرز البنكرياس نوعين من الهرمونات البيبتيدية: الأنسولين والكرياكرون




البنية الجزيئية للأنسولين: ذو طبيعة بروتينية يتكون من 51 حمض أميني وتتوزع على سلسلتين جمع بينهما جسورة ثانوي الكبريت.

تجربة 2 : معادرة الغليكوجين الكبدي والكريوكوز الدموي قبل وبعد حقن الغليكاكون عند كلب.



البنية الجزيئية للكرياكرون: عبارة عن عديد البيبتيد يتكون من سلسلة واحدة تحتوي على 29 حمض أميني

تجربة 1 : استجابة الخلايا الكبدية لتأثير الأنسولين عند كلب مستأصل البنكرياس. تعرض لحقنات متكررة من الأنسولين.




التعليمات


1. من خلال نتائج التجربة 1، استنتج أدوار البنكرياس وبالاستعانة بنتيجة التجربة 2، بين كيف تؤثر البنكرياس على تحلون الدم.
2. بعد وصف الطبيعة الكيميائية للهرمونات البنكرياسية الممثلة في الوثيقة 2، استنتاج معللاً جوابك بمعطيات الوثيقة 3 كيفية دور كل هرمون في تنظيم تحلون الدم.

النشاط 4: البنية البنكرياسية المسؤولة عن إفراز كل من الأنسولين والكلياكون

يفرز البنكرياس هرموني الأنسولين والكلياكون اللذان ينظمان تحلون الدم فما هي البنية البنكرياسية المسؤولة عن إفراز كل من الأنسولين والكلياكون؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقترح دراسة معطيات الوثيقة التالية:




شكل 2 : رسم تفسيري للبنية النسيجية للبنكرياس



شكل 1 : رسم بياني لموقع البنكرياس

للكشف عن الخلايا المفرزة للكلياكون والأنسولين يقوم بحقن مقاطع بنكرياسية بمضادات أجسام مشعة موجهة ضد هرمون الكلياكون أو الأنسولين، ثم تتم ملاحظة جزيرات Langerhans. في حالة استعمال مضادات أجسام مشعة موجهة ضد هرمون الكلياكون نحصل على النتيجة الممثلة في الشكل 3 (د) من الوثيقة أعلاه، و عند استعمال مضادات أجسام مشعة موجهة ضد الأنسولين نحصل على النتيجة الممثلة في الشكل 3 (ج).



(د) الخلايا β

(ج) الخلايا β

(ب) رسم تفسيري لجزيرة Langerhans

(أ)

50 μm

التعليمات

- هل خلال الشكلين 1 و 2، صفت البنية النسيجية للبنكرياس.
- انطلاقاً من نتيجة التجربة الممثلة في الشكل 3، حدد معللاً إجابتك البنكرياسية المفرزة لكل من الأنسولين والكلياكون؟

بطاقة النشاط 5: الاستجابة الهرمونية لتغيرات تحلون الدم

للهرمونات البنكرياسية تأثير على تحلون الدم فهل هذا الأخير يؤثر على النشاط الإفرازي للخلايا α و β المفرزة للهرمونين؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقترح دراسة التجاريتين التاليتين:


تجربة 2

قياس تغيرات تحلون الدم وتركيز الأنسولين والكلياكون في الدم، في حالة صيام.

بعد الصيام 96h	بعد الصيام 72h	بعد الصيام 48h	بعد الصيام 24h	بداية الصيام	قبل الصيام 24h	أخذ القياسات كل يوم بين الثامنة والتاسعة صباحاً
71,0	70,0	72,0	78,0	86,0	89,0	تحلون الدم (mg/100ml)
165	178	189	157	126	126	كلياكون (pg/ml)
2,0	3,0	4,0	5,0	10,0	9,0	أنسولين ($\mu\text{u}/\text{ml}$)

تجربة 1

تطور كل من تحلون الدم وتركيز الأنسولين والكلياكون في الدم بعد تناول وجبة غذائية غنية بالسكريات.



التعليمات


- انطلاقاً من تحليل نتائج التجربة 1، حدد العلاقة بين تناول الكلياكوز وإفراز كل من الأنسولين والكلياكون.
- من خلال نتائج التجربة 2، استنتج كيفية استجابة الهرمونات البنكرياسية لتغيرات تحلون الدم.

النشاط 7 : تأثير الهرمونات البنكرياسية على الخلايا الهدف

تقوم الهرمونات البنكرياسية بتنظيم تحلون الدم عبر تأثيرها على أعضاء هدف عرفاً منها الكبد، فما هي مختلف الأعضاء الهدف للهرمونات البنكرياسية؟ وما هي آلية عمل تلك الهرمونات في الخلايا الهدف؟ للإجابة عن هذه التساؤلات نقترح دراسة معطيات الوثائق التالية:

الوثيقة 1 : تأثير الأنسولين والغликاكون على الأعضاء الهدف

- ★ تقوم بمعايير نسبة الغليكوجين الكبدي عند كلب مستأصل البنكرياس تعرض لحقن متكررة من الأنسولين، فحصلنا على النتائج الممثلة على مبيان الشكل أ.
- ★ تقوم بمعايير الغليكوجين الكبدي والكليكوز الدموي عند كلب صائم قبل وبعد حقن الغликاكون. النتائج ممثلة على مبيان الشكل ب.




- ★ نضع نسيجاً عضلياً في وسط زرع ملائم ونعاير كمية الكليكوز التي يستهلكها هذا النسيج من الوسط وكمية الغليكوجين التي يدخلها، وذلك خلال 10 دقائق. النتائج ممثلة على الجدول التالي:

تركيز الكليكوز في النسيج العضلي ب mg/g من العضلة خلال 10min		تركيز الكليكوز في النسيج العضلي ب mg/g من العضلة خلال 10min	
وسط بدون أنسولين	وسط به أنسولين	وسط بدون أنسولين	وسط به أنسولين
1.43	1.88	2.45	2.85

- ★ تتبّع التجربة الغنية بالسكريات في البدانة. ولتعرف العلاقة بين الكليكوز والبدانة أخضع حيوان لمرض السكري التجاري (تممير الخلايا المفرزة للأنسولين) فلُوحظ أن تركيب الدهنيات في النسيج الودكي *Tissu adipeux* قد انخفض بـ 90%.

الوثيقة 2 : تأثير الهرمونات البنكرياسية على الخلايا الهدف

عند حقن فأر بالأنسولين المشع، يلاحظ انتشار النشاط الإشعاعي حول الخلايا الكبدية والعضلية والودكية. وقد بيّنت تقنية التصوير الذاتي L'autoradiographie تثبيت الجزيئات المشعة على الأغشية الخلوية في مستوى جزيئات بروتينية تلعب دور المستقبلات النوعية.



1. من خلال معطيات الوثيقة 1، حدد الأعضاء الهدف للهرمونات البنكرياسية مبيناً كيفية تأثير كل هرمون على تلك الأعضاء (يمكن الاستعانة بخطاطة).
2. انطلاقاً من نتيجة التجربة الممثلة في الوثيقة 2، صِف كيف تتدخل الهرمونات البنكرياسية في تأثيرها على الخلايا الهدف.
3. من خلال إجابتك على السؤال السابق، أنجز رسمياً خطيطاً يوضح كيفية تأثير هرمون الكليكاكون على الخلايا الكبدية الهدف.