

تصحيح تمارين حول التركيز والحاليل الإلكترولية .

تمرين 3

1 — حساب التركيز المولية الفعلية للأيونات المتواجدة في محلول :
 الأيونات المتواجدة في محلول هي : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_3^-$ محلول نترات النحاس II ، محلول كلورور الصوديوم
 كمية مادة الأيونات المتواجدة في كل محلول قبل مزج الخليطين :
 معادلة ذوبان نترات النحاس II في الماء هي :

$$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2(s) \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_3^-$$

 هذا النموذج هو تفاعل تمام أي أنه حسب الجدول الوصفي للتفاعل لدينا :

$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2(s) \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_3^-$			القدم
n_0	0	0	0
$n_0 - x$	x	$2x$	x
0	n_0	$2n_0$	عصيل الماء mol

$$n(\text{Cu}^{2+}) = C_1 V_1 = 0,25 \times 50 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 12,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{NO}_3^-) = 2n(\text{Cu}^{2+}) = 25 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

معادلة ذوبان كلورور الصوديوم في الماء لتعطى محلول مائي لكlorور الصوديوم



كمية مادة أيونات Cl^- هي : Na^+

$$n(\text{Na}^+) = n(\text{Cl}^-) = C_2 V_2 = 10^{-2} \text{ mol}$$

تركيز الأيونات المتواجدة في الخليط بعد مزج المحلولين

$$V_T = V_1 + V_2 = 150 \text{ ml} : \text{حجم الخليط}$$

: تركيز أيونات Cu^{2+} *

$$[\text{Cu}^{2+}] = \frac{n(\text{Cu}^{2+})}{V_T} = \frac{12,5 \cdot 10^{-3}}{150 \cdot 10^{-3}} = 0,083 \text{ mol/l}$$

: تركيز أيونات NO_3^- *

$$[\text{NO}_3^-] = \frac{n(\text{NO}_3^-)}{V_T} = \frac{2n(\text{Cu}^{2+})}{V_T} = 2[\text{Cu}^{2+}] = 0,167 \text{ mol/l}$$

تركيز أيونات Cl^-

$$[\text{Cl}^-] = \frac{n(\text{Cl}^-)}{V_T} = \frac{n(\text{Na}^+)}{V_T} = \frac{10^{-2}}{150 \cdot 10^{-3}} = [\text{Na}^+] = 0,067 \text{ mol/l}$$

2 — التأكيد من حياد الخليط الحصول عليه :

في محلول مائي ، يكون محايضاً كهربائياً إذا كانت كميات الشحنات الكهربائية الموجبة المحملة من طرف الكاتيونات متساوية لكميات الشحنات السالبة المحملة من طرف الأنيونات . أي أن :

$$n(Na^+) + 2n(Cu^{2+}) = n(NO_3^-) + n(Cl^-)$$

$$\frac{n(Na^+)}{V_T} + 2 \frac{n(Cu^{2+})}{V_T} = \frac{n(NO_3^-)}{V_T} + \frac{n(Cl^-)}{V_T}$$

$$[Na^+] + 2[Cu^{2+}] = [NO_3^-] + [Cl^-]$$

$$0,067\text{mol/l} + 0,166\text{mol/l} = 0,167\text{mol/l} + 0,067\text{mol/l}$$

ما يؤكّد أنّ الخليط محايداً كهربائياً.

ثرين 4

معادلة ذوبان كبريتات النحاس II المميّة في الماء :



الجدول الوصفي للتفاعل هو :

$(CuSO_4, nH_2O)_s \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-} + nH_2O$				النقدم
n_0	0	0	منيّب	الحالة البدئية mol
$n_0 - x$	x	x	منيّب	الحالة النهائية mol
0	n_0	n_0		حصيلة المادة mol

حساب n_0 كمية مادة كبريتات النحاس II المميّة :

$$n_0 = \frac{m}{159,5 + 18n} \quad \text{أي أن } M = 159,5 + 18n \quad n_0 = \frac{m}{M}$$

$$[Cu^{2+}] = [SO_4^{2-}] = \frac{n_0}{V_T} = \frac{m}{(159,5 + 18n).V_T}$$

$$[Cu^{2+}].(159,5 + 18n).V_T = m$$

$$18[Cu^{2+}]0V_T \cdot n = m - [Cu^{2+}].159,5.V_T \quad \text{تركيز الأيونات المتواجدة في محلول هي}$$

$$n = \frac{m - [Cu^{2+}].159,5.V_T}{18[Cu^{2+}].V_T}$$

تطبيق عددي : $n=5$

ثرين 5

1 — كتلة المواد الخلية الموجودة في قرص من الدواء :



نضع $M=8,33g$ الكتلة الإجمالية للقرص و $m_1 = 0,680g$ كتلة كربونات الكالسيوم و $m_2 = 0,080g$ كتلة هيدروجينوكربونات المغنيزيوم . m كتلة المواد الخلية .

$$M = m_1 + m_2 + m \Rightarrow m = M - (m_1 + m_2) = 7,57g$$

2 — صيغة كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ لأنّ أيون الكربونات : CO_3^{2-} وأيون الكالسيوم

صيغة هيدروجينوكربونات المغنيزيوم $Mg(HCO_3)_2$ لأنّ أيون الهيدروجينوكربونات HCO_3^- وأيون المغنيزيوم Mg^{2+}

3 — عند إذابة القرص في الماء $(20\text{cl} = 20.10^{-2}\ell = 200\text{ml})$



4 — حساب كمية مادة كربونات الكلسيوم المستعملة :

$$n(\text{CaCO}_3) = \frac{m(\text{CaCO}_3)}{M(\text{CaCO}_3)} = 6,79 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

كمية مادة هيدروجينوكربونات المغذيوم :

$$n(\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2) = \frac{m(\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2)}{M(\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2)} = 5,46 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

5 — حساب التركيز الفعلية لمختلف الأيونات الموجودة في محلول .



حساب تركيز أيونات الكلسيوم :

$$\begin{aligned} [\text{Ca}^{2+}] &= \frac{n(\text{Ca}^{2+})}{V} = \frac{n(\text{CaCO}_3)}{V} \\ &= 0,034 \text{ mol/l} \end{aligned}$$

حساب تركيز أيونات الكربونات :

$$[\text{CO}_3^{2-}] = \frac{n(\text{CO}_3^{2-})}{V} = \frac{n(\text{CaCO}_3)}{V} = [\text{Ca}^{2+}] = 0,034 \text{ mol/l}$$

حساب تركيز أيونات المغذيوم

$$[\text{Mg}^{2+}] = \frac{n(\text{Mg}^{2+})}{V} = \frac{n(\text{Mg}(\text{HNO}_3)_2)}{V} = 0,273 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$$

$$[\text{HCO}_3^-] = \frac{n(\text{HCO}_3^-)}{V}$$

$$\frac{n(\text{HCO}_3^-)}{2} = n(\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2) \Rightarrow n(\text{HCO}_3^-) = 2n(\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2)$$

$$[\text{HCO}_3^-] = 2[\text{Mg}^{2+}] = 0,546 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$$

تطبيقات لتابع تحول كيميائي

مرين 1

1 — المعادلة الكيميائية للتفاعل :



2 — الجدول الوصفي للتفاعل :

$$n_0(\text{Fe}) = \frac{m}{M(\text{Fe})} = 0,2 \text{ mol}$$

حساب كمية المادة البدئية للحديد :

$$n_0(\text{Cl}_2) = \frac{V}{V_m} = 0,25 \text{ mol}$$

كمية المادة البدئية للكلور :

2Fe	+	3Cl₂	→	2FeCl₃	النقدم	
0,20		0,25		0	0	الحالة البدئية mol
0,20-2x		0,25-3x		2x	x	أثناء التفاعل
0,20-2x _{max}		0,25-3x _{max}		2x _{max}	x _{max}	الحالة النهائية mol

3 — المتفاعل المد : نفترض أ، المتفاعل المد هو Fe

$$0,20 - 2x_{\text{max}} = 0 \Rightarrow x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol}$$

نعرض في المعادلة $0,25 - 0,3 < 0$ وبالتالي فالمتفاعل المد هو ثاني الكلور والتقدم الأقصى هو :

$$0,25 - 3x_{\text{max}} = 0 \Rightarrow x_{\text{max}} = 0,083 \text{ mol}$$

وبالتالي فحصيلة المادة هي :

$$n(\text{Fe}) = 0,033 \text{ mol}$$

$$n(\text{Cl}_2) = 0$$

$$n(\text{FeCl}_3) = 0,166 \text{ mol}$$

الجسم المستعمل بوفرة هو الحديد والكتلة المتبقية من هذا الجسم هي :

$$n(\text{Fe}) = \frac{m'}{M(\text{Fe})} \Rightarrow m' = n(\text{Fe}) \cdot M(\text{Fe}) = 1,85 \text{ g}$$

وكتلة كلورور الحديد III المتكون هي :

$$n(\text{FeCl}_3) = \frac{m''}{M(\text{FeCl}_3)} \Rightarrow m'' = n(\text{FeCl}_3) \cdot M(\text{FeCl}_3) = 26,97 \text{ g}$$

سؤال إضافي : تأكد من احتفاظ الكتلة خلال هذا التفاعل .

4 — نطلق من خليط ستوكيموري أي سيصبح الجدول الوصفي على الشكل التالي :

يكون الخليط ستوكيموري إذا كانت كميات المادة البدئية للمتفاعلة متوفرة حسب المعاملات النسبية للمتفاعلات في المعادلة . وتحتفظ المتفاعلات كلها عند نهاية التفاعل .

2Fe	+	3Cl₂	→	2FeCl₃	النقدم	
n₀(Fe)		n₀(Cl₂)		0	0	الحالة البدئية mol
n₀(Fe) - 2x		n₀(Cl₂) - 3x		2x	x	أثناء التفاعل
n₀(Fe) - 2x _{max}		n₀(Cl₂) - 3x _{max}		2x _{max}	x _{max}	الحالة النهائية mol

من خلال الجدول الوصفي يتبيّن أن :

$$\frac{n_0(\text{Fe})}{2} = \frac{n_0(\text{Cl}_2)}{3} \Rightarrow n_0(\text{Fe}) = \frac{2}{3} n_0(\text{Cl}_2)$$

$$\frac{m}{M(\text{Fe})} = \frac{2}{3} \frac{v}{V_m} \Rightarrow m = \frac{2}{3} \frac{v \cdot M(\text{Fe})}{V_m} = 1,55 \text{ g}$$

ثرين 2

1 — حساب كمية مادة الألومينيوم اللازم استعمالها لكي الخليط البدئي موافقاً للمعاملات التناصية :
حسب معادلة التفاعل :

$$\frac{n_i(Fe_2O_3)}{1} = \frac{n_i(Al)}{2} \Rightarrow n_i(Al) = 2n_i(Fe_2O_3)$$

$$n_i(Al) = 2,0\text{mol}$$

2 — الكتلة الإجمالية البدئية للمتفاعلات هي :

$$m_i = m_i(Al) + m_i(Fe_2O_3)$$

$$m_i = M(Al).n_i(Al) + M(Fe_2O_3).n_i(Fe_2O_3)$$

$$m_i = 54\text{g} + 159,6\text{g} = 213,6\text{g}$$

3 — الجدول الوصفي للتفاعل:

$Fe_2O_3(s) + 2Al(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 2Fe(s)$				النظام	
الحالة البدئية	أثناء التفاعل	الحالة النهائية	حصيلة المادة		
1,0mol	2,0mol	0	0	0	الحالات النهائية
1-x	2-2x	x	2x	x	
1-x _{max}	2-2x _{max}	x _{max}	2x _{max}	x _{max}	
0	0	1mol	2mol	1mol	

الكتلة الإجمالية للنواتج :


$$m_f = m_f(Al_2O_3) + m_f(Fe)$$

$$m_f = M(Al_2O_3).n_f(Al_2O_3) + M(Fe).n_f(Fe)$$

$$m_f = 102\text{g} + 111,6\text{g} = 213,6\text{g}$$

ثرين 3

1 — معادلة التفاعل



2 — حساب كمية المادة البدئية للحديد a_0 بحيث أن :

$$a_0 = \frac{m(Fe)}{M(Fe)} = 8,96 \cdot 10^{-3} \text{mol}$$

حساب كمية المادة البدئية لغاز الكلور :

نعتبر غاز الكلور كامل ونطبق علاقة الغازات الكاملة :

$$p_0 V_0 = b_0 R T \Rightarrow b_0 = \frac{p_0 V_0}{R T}$$

$$b_0 = 20,9 \cdot 10^{-3} \text{mol}$$

3 — الجدول الوصفي للتفاعل :

حساب التقدم الأقصى : $9 - 2x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 4,5 \text{mmol}$


النقط			
2Fe(s)	+ 3Cl ₂ (g)	→ 2FeCl ₃ (s)	
9mmol	20,9mmol	0	الحالة البدئية
9-2x	20,9-3x	2x	أثناء التفاعل
9 -2x _{max}	20,9 - 3x _{max}	2x _{max}	الحالة النهائي
0	7,4mmol	9mmol	حصيلة المادة

4 — الضغط النهائي عندما تأخذ درجة الحرارة قيمتها البدئية 20°C

$$p_f V_i = n_f (Cl_2) RT_i \Rightarrow p_f = \frac{n_f (Cl_2) RT_i}{V_i} = \frac{7,4 \cdot 10^{-3} \cdot 8,314,293}{500 \cdot 10^{-6}} = 36,05 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

ćرین 4

1 — معادلة التفاعل الحاصل



$$ax = a'$$


$$ay = 2b'$$

$$2b = 2a' + b'$$

$$a = 1 \Rightarrow a' = x$$

$$b' = \frac{y}{2}$$

$$b = x + \frac{y}{4}$$



2 — حساب كمية مادة كل ناتج :

كمية مادة غاز ثانوي أو كسيد الكربون :

$$n_f (CO_2) = \frac{v}{V_m} = \frac{232 \cdot 10^{-3}}{24} = 9,66 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

كمية مادة الماء :

$$n_f (H_2O) = \frac{m}{M} = \frac{0,217}{18} = 12 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

3 — الجدول الوصفي للتفاعل :

حسب الجدول الوصفي للتفاعل لدينا :

$$x \cdot z_{max} = 9,66 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\frac{y \cdot z_{max}}{2} = 12 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\frac{2x}{y} = \frac{9,66}{12} \Rightarrow \frac{y}{x} = 2,5 \Rightarrow y = 2,5x$$

C_xH_y	$+ \left(x + \frac{y}{4}\right)O_2$	$\rightarrow xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O$	النقم	
$\frac{0,14}{12x+y}$	$n_i(O_2)$	0	0	الحالة البدئية
$\frac{0,14}{12x+y} - z$	$n_i(O_2) - z\left(x + \frac{y}{4}\right)$	zx	$\frac{yz}{2}$	أثناء الفاعل
$\frac{0,14}{12x+y} - z_{max}$	$n_i(O_2) - z_{max}\left(x + \frac{y}{4}\right)$	xz_{max}	$\frac{yz_{max}}{2}$	حالة النهاية
	9,66mmol	12mmol		

4 — لتحقيق الشرط التالي : y عدد زوجي أصغر من 12
 C_4H_{10} يجب أن تكون $y = 10$ و $x = 4$ وبالتالي فالصيغة الكيميائية للمركب هي $y = 2,5x$