

الإحصاء

I- تذكير:

1- تعاريف:

- (1) الدراسة الإحصائية: هي دراسة لظاهرة أو خاصية يتميز بها أفراد مجموعة.
- (2) الساكن الإحصائية: هي المجموعة التي تشملها الدراسة الإحصائية وكل عنصر من هذه المجموعة يسمى فردا أو وحدة إحصائية.
- (3) الميزة الإحصائية: هي المعيار الذي يصنف وفقه أفراد الساكنة الإحصائية وهي نوعان:
(أ) الميزة الكمية: هي الميزة التي يمكن التعبير عنها بأعداد.. (السن؛ الطول؛ الوزن؛....).
(ب) الميزة النوعية: هي الميزة التي لا يمكن التعبير عنها بأعداد.. (اللون؛ اللغة؛ الجنس؛ التبعثر الدراسي؛....).
- (4) الحصيص الموافق لقيمة مميزة هو عدد أفراد الساكنة الإحصائية التي تتوفر فيهم هذه القيمة..
- (5) الحصيص الإجمالي لمتسلسلة إحصائية هو مجموع الحصصات.
- (6) الحصيص المتراكم: المرتبط بقيم من قيم الميزة الكمية هو عدد أفراد الساكنة الإحصائية الذين يتوفرون على ميزة أصغر من أو تساوي هذه القيمة.

(7) التردد f_i الموافق للميزة x_i هو النسبة بين الحصيص n_i والحصيص الإجمالي N . أي: $f_i = \frac{n_i}{N}$.

(8) التردد المتراكم: الموافق لقيمة الميزة x_i هو نسبة الحصيص المتراكم N_i والحصيص الإجمالي N أي $F_i = \frac{N_i}{N}$.

(9) النسبة المئوية P_i الموافقة للميزة x_i هي: $P_i = \frac{n_i}{N} \times 100 = 100f_i$.

(10) المعدل الحسابي: لتكن $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ القيم التي تأخذها الميزة x .

و: $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$ الحصصات الموافقة لها.

المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية هو العدد:

$$m = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + n_3 \times x_3 + \dots + n_k \times x_k}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k}$$

ملحوظة: إذا كانت المتسلسلة معبر عنها بالأصناف فإنه حساب المعدل الحسابي نعتبر مراكز الأصناف كقيم للميزة.

مثل: بالنسبة للصنف $[a_1, a_2]$ نأخذ $x_1 = \frac{a_1 + a_2}{2}$.

تطبيق 1: أجرت دراسة على 20 عائلة تهم عدد الأطفال في كل عائلة

وأعطت النتائج التالية.

3-2-4-3-4-0-3-2-4-1

1-4-4-4-3-3-4-4-3-1

الحصيص الإجمالي هو: 20. (أي: $N = 20$).

- (1) أعط جدولاً للحصصات؛ الحصصات المتراكمة؛ الترددات؛ الترددات المتراكمة و النسب المئوية.
- (2) مثل مبانينا هذه المتسلسلة الإحصائية.
- (3) أحسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة.


(1) جدول الحصصات؛ الحصصات المتراكمة؛ الترددات؛ الترددات المتراكمة؛ النسب المئوية.

4	3	2	1	0	x_i - الأطفال
8	6	2	3	1	n_i - الحصصات
20	12	6	4	1	N_i - المتراكم
0.4	0.3	0.1	0.15	0.05	التردد: f_i
1	0.6	0.3	0.2	0.05	ت - المتراكم: F_i
40%	30%	10%	15%	5%	النسبة المئوية: P_i
144	108	36	54	18	α°

- التمثيلات المبيانية

أ - التمثيل (أو مخطط) بالقضبان؛ تمثيل يخط منكسر؛ مخطط قطاعي.


التمثيل التالي يسمى: **مخطط قطاعي دائري** .



التمثيل بالأحمر: يسمى **تمثيل (أو مخطط) بالقضبان**: للحصصات

التمثيل بالأزرق: يسمى **تمثيل بخط منكسر**: للحصصات

الحصصات



3) المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية .

ليكن m المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية

$$\text{إذن: } m = \frac{1 \times 0 + 3 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 6 + 4 \times 8}{20}$$

$$\text{ومنه: } m = 2,85$$

تطبيق 2:

الجدول التالي يعطي تصنيف السن لقسم السنة الثالثة الإعدادي في إحدى المؤسسات التعليمية.

السن (الصف)	الحصصات	ح - المتركم	المركز
$[17;19[$	4	32	18
$[15;17[$	8	28	16
$[13;15[$	20	20	14

ليكن m المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية

$$\text{إذن: } m = \frac{14 \times 20 + 16 \times 8 + 18 \times 4}{32}$$

$$\text{ومنه: } m = 15$$

ب - تمثيل أو مخطط بالأشرطة .

لاحظ أن: المستطيلات لها نفس العرض. ($19 - 17 = 17 - 15 = 15 - 13 = 2$).



تعريف :

أصغر قيمة الميزة التي حصيصها المتراكم أكبر من أو يساوي نصف الحصيص الإجمالي هي القيمة الوسطية.

أمثلة :

➤ في التطبيق 1 :

لدينا نصف الحصيص الإجمالي هو : $\frac{20}{2} = 10$

إذن : 3 هي القيمة اوسطية . (لأن 3 هي أصغر قيمة ميزة التي حصيصها المتراكم (12) أكبر من أو يساوي نصف الحصيص الإجمالي.

➤ في التطبيق 2 :

لدينا نصف الساكنة الإحصائية هو : $\frac{32}{2} = 16$

في الصنف المقابل للحصيص المتراكم 20 (أي $[13;15[$) تو جد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية

ملاحظة :

يمكن القول أن : 14 (مركز الصنف $[13;15[$) هي القيمة الوسطية للمتسلسلة الإحصائية لأن : $\frac{13+15}{2} = 14$

(5) منوال متسلسلة إحصائية :

تعريف :

منوال متسلسلة إحصائية هو قيمة (أو صنف) الميزة التي لها أكبر حصيص .

أمثلة :

** في التطبيق 1 :

منوال هذه المتسلسلة الإحصائية هو 4 لأن لها أكبر حصيص هو 8

** في التطبيق 2 :

منوال هذه المتسلسلة الإحصائية يوجد في الصنف : $[13;15[$

(6) التشتت :

تعريف :

نعتبر متسلسلتين إحصائيتين S_1 و S_2 لهما نفس المعدل

الحسابي m . نقول إن S_1 أقل تشتتاً من S_2 يعني أن قيم

ميزة S_1 أقرب إلى m من قيم ميزة S_2 .

مثال :

الجدول التالي يعطي نقط التي حصل عليها 20 تلميذ من 3/6 في مادة الرياضيات .

17	15	10	7	4	الرياضيات
2	6	4	3	5	عدد التلاميذ

الجدول التالي يعطي نقط التي حصل عليها 20 تلميذ من 3/5 في مادة الرياضيات.

17	14	13	11	9	8	7	3	الرياضيات
2	1	4	2	4	2	4	1	عدد التلاميذ

✓ حساب المعدل الحساب في كل من القسمين : 3/5 و 3/6.

✓ حساب المعدل الحساب في القسم : 3/5.

$$m = \frac{17 \times 2 + 14 \times 1 + 13 \times 4 + 11 \times 2 + 9 \times 4 + 8 \times 2 + 7 \times 4 + 3 \times 1}{2 + 1 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 1}$$

$$m = \frac{34 + 14 + 52 + 22 + 36 + 16 + 28 + 3}{20} \text{ أي :}$$

$$m = \frac{205}{20} = 10,25 \text{ ومنه :}$$

✓ حساب المعدل الحساب في القسم : 3/6.

$$m' = \frac{17 \times 2 + 15 \times 6 + 10 \times 4 + 7 \times 3 + 4 \times 5}{2 + 6 + 4 + 3 + 5}$$


$$m' = \frac{34 + 90 + 40 + 21 + 20}{2 + 6 + 4 + 3 + 5} \text{ أي :}$$

$$m' = \frac{205}{20} = 10,25 \text{ ومنه :}$$

التمثيل المبياني

الحصصات


3/6



قيمة الميزة

الحصصات

3/5



لاحظ أن : المعدل الحسابي لهتين المتسلسلتين هو : 10,5 (للقسمين معا نفس المعدل الحسابي $m = m' = 10,5$).

لاحظ أن : العصى في مبيان نقط تلاميذ 3/6 أكثر تجمعا حول المعدل الحسابي من عصى مبيان نقط 3/5 .

نقول إن : نقط تلاميذ 3/6 (نقط تلاميذ 3/5) أقل تشتتا من نقط تلاميذ 3/5 (أكثر تشتتا من نقط تلاميذ 3/6).